

USO VETERINÁRIO

Suspensão estéril de cloridrato de ceftiofur

Para uso subcutâneo ou intramuscular em bovinos e uso intramuscular em suínos.

ATENÇÃO: OBEDECER AOS SEGUINTE PERÍODOS DE CARÊNCIA
BOVINOS: ABATE: NÃO HÁ NECESSIDADE DE PERÍODO DE RETIRADA PARA O ABATE. LEITE: NÃO HÁ NECESSIDADE DE PERÍODO DE RETIRADA PARA CONSUMO DE LEITE. **SUÍNOS:** ABATE: NÃO HÁ NECESSIDADE DE PERÍODO DE RETIRADA PARA O ABATE.

A UTILIZAÇÃO DO PRODUTO EM CONDIÇÕES DIFERENTES DAS INDICADAS NESTA BULA PODE CAUSAR A PRESENÇA DE RESÍDUOS ACIMA DOS LIMITES APROVADOS, TORNANDO O ALIMENTO DE ORIGEM ANIMAL IMPRÓPRIO PARA O CONSUMO.

Excenel RTU é uma formulação pronta para uso que contém sal cloridrato de ceftiofur, antibiótico cefalosporínico de amplo espectro, ativo contra bactérias Gram-positivas e Gram-negativas, incluindo cepas produtoras de beta-lactamase. Como outras cefalosporinas, Ceftiofur é bactericida "in vitro", interferindo na síntese da parede celular das bactérias suscetíveis.

Fórmula

Cada 100 mL contém:

Cloridrato de ceftiofur micronizado 5,0 g

Veículo q.s.p 100,0 mL

Indicações

Bovinos: tratamento de pneumonias e febre do transporte associadas a *Pasteurella haemolytica*, *P. multocida* e *Haemophilus sommus*, enterites (*Salmonella spp* e *Escherichia coli*), podridão nos cascos (*Fusobacterium necrophorum* e *Bacteroides melaninogenicus*) e infecções geniturinárias.

Suínos: tratamento e controle da doença respiratória bacteriana (pneumonia bacteriana suína) associada a *Actinobacillus (Haemophilus) pleuropneumoniae*, *Pasteurella multocida*, enterites (*Salmonella choleraesuis*), meningoencefalite (*Streptococcus suis* tipo 2) e infecções genitourinárias.

Doses e modo de usar

Bovinos: 1 mL / 50 kg

Administrar na dose de 1 mg de Ceftiofur / kg de peso, pela via sub-cutânea ou intramuscular. Repetir o tratamento após intervalo de 24 horas por três dias consecutivos.

Suínos:

Administrar na dose de 1 a 3 mg de Ceftiofur / kg de peso, somente pela via intramuscular. Repetir o tratamento após intervalo de 24 horas por três dias consecutivos.

Agitar bem antes de usar. Não havendo alteração do quadro clínico, retornar ao veterinário para revisão do diagnóstico.

Contra-indicações

O uso de EXCENEL RTU é contra-indicado para animais hipersensíveis à droga.

Advertências

Penicilinas e Cefalosporinas podem causar reações alérgicas em indivíduos sensíveis. Exposições tóxicas a alguns antimicrobianos, inclusive Ceftiofur, podem provocar reações alérgicas moderadas ou graves em alguns indivíduos. Exposições repetidas ou prolongadas podem induzir à sensibilização. Evitar contato direto do produto com a pele, olhos, boca e roupas.

Pessoas com hipersensibilidade conhecida à penicilina ou cefalosporinas devem evitar contato com o produto.

Em caso de acidentes oculares, lavar os olhos com bastante água por 15 minutos. Em acidentes tópicos, lavar a pele com água e sabão. Retirar a roupa contaminada. Se ocorrer reações alérgicas (erupção na pele, urticária, dificuldade respiratória), procurar cuidados médicos.

Precauções

• Áreas de descoloração associadas ao local da injeção no período inferior ou igual a 11 dias podem resultar em extirpação da região afetada no abate.

Conservar em temperatura entre 15°C e 30°C e fora do alcance de crianças e de animais domésticos.

Venda sob prescrição e aplicação do Médico Veterinário.

PRODUTO IMPORTADO