

Linco-Spectin[®] 440

USO VETERINÁRIO

ATENÇÃO: OBEDECER AOS SEGUINTE PERÍODOS DE CARÊNCIA

SUÍNOS:

ABATE: O PRODUTO NÃO REQUER PERÍODO DE CARÊNCIA PARA O ABATE DE SUÍNOS TRATADOS.

AVES:

ABATE: O PRODUTO NÃO REQUER PERÍODO DE CARÊNCIA PARA O ABATE DE AVES TRATADAS.

OVOS: ESTE PRODUTO NÃO DEVE SER APLICADO EM AVES PRODUTORAS DE OVOS PARA O CONSUMO HUMANO.

A UTILIZAÇÃO DO PRODUTO EM CONDIÇÕES DIFERENTES DAS INDICADAS NESTA BULA PODE CAUSAR A PRESENÇA DE RESÍDUOS ACIMA DOS LIMITES APROVADOS, TORNANDO O ALIMENTO DE ORIGEM ANIMAL IMPRÓPRIO PARA O CONSUMO.

FÓRMULA

Cada 100 g contém:

Lincomicina (como Cloridrato de Lincomicina) 22 g

Espectinomicina (como Sulfato Tetraidratado de Espectinomicina) 22 g

Excipiente q.s.p. 100 g

IMPORTANTE

Misturar completamente à ração antes do uso. A embalagem aberta deve ser mantida em temperatura ambiente (15°C a 30°C) e protegido da luz solar. Manter fora do alcance de crianças e animais domésticos.

INDICAÇÕES

Suínos

Controle e tratamento de enterites associadas com *Brachyspira hyodysenteriae*, *Brachyspira pilosicoli*, *Lawsonia intracellularis*, *Escherichia coli* e *Salmonella* spp.

Como auxiliar no controle de pneumonia micoplásmica (*Mycoplasma hyopneumoniae*) e pneumonia bacteriana (*Pasteurella multocida*, *Streptococcus* spp).

Aves

Controle da mortalidade precoce associada a *Escherichia coli*.

CONTRAINDICAÇÕES

Coelhos, “Porquinho-da-Guiné”, hamsters, equinos e ruminantes não devem ter acesso a alimento que contenha Lincomicina. A ingestão por essas espécies pode resultar em efeitos gastrintestinais severos.

EFEITOS COLATERAIS

Ocasionalmente, os suínos tratados com Lincomicina podem apresentar diarreia e/ou edema do ânus nos primeiros 2 dias de tratamento. Em raras ocasiões, alguns animais podem apresentar vermelhidão na pele e comportamento irritadiço. Estas alterações podem ser autocorrigidas dentro de 5 a 8 dias, sem necessidade de interrupção do tratamento.

DOSAGENS E MODO DE USAR

Suínos

Tratamento de disenteria suína

Administrar 88 g de atividade antibiótica (44 g de Lincomicina + 44 g de Espectinomicina) por 1.000 kg de alimento completo e oferecer como única ração, durante 3 semanas.

Controle de disenteria suína

Administrar 44 g de atividade antibiótica (22 g de Lincomicina + 22 g de Espectinomicina) por 1.000 kg de alimento completo e oferecer como única ração.

Controle de pneumonia micoplásmica

Administrar 44 a 110 g de atividade antibiótica por 1.000 kg de alimento completo e oferecer como única ração, durante 3 semanas.

Prevenção e controle de ileíte

Administrar 44 a 88 g de atividade antibiótica por 1.000 kg de alimento completo e oferecer como única ração, durante 3 semanas.

Aves

Controle da mortalidade precoce

Administrar 88 g de atividade antibiótica por 1.000 kg de ração e oferecer como único alimento, durante 3 semanas.

EXEMPLOS PARA PREPARAR

Para preparar suplementos medicados que contenham as seguintes quantidades de atividade antibiótica:	Misturar as seguintes quantidades de Linco-Spectin 440 para preparar 1 tonelada (1.000 kg) de suplemento medicado:
11 g/t	25 g
22 g/t	50 g
44 g/t	100 g
88 g/t	200 g
110 g/t	250 g
132 g/t	300 g

RESTRIÇÃO DE USO

Não administrar em aves de postura.

Venda sob prescrição e aplicação sob orientação do Médico Veterinário.