

# Neobiotic® -P325

## USO VETERINÁRIO

### ATENÇÃO: OBEDECER AOS SEGUINTE PERÍODOS DE CARÊNCIA

#### BOVINOS:

ABATE: O ABATE DOS ANIMAIS TRATADOS SOMENTE DEVE SER REALIZADO 1 DIA APÓS A ÚLTIMA APLICAÇÃO.

LEITE: O LEITE DOS ANIMAIS TRATADOS SOMENTE DEVE SER CONSUMIDO 36 HORAS APÓS A ÚLTIMA APLICAÇÃO.

#### OVINOS:

ABATE: O ABATE DOS ANIMAIS TRATADOS SOMENTE DEVE SER REALIZADO 2 DIAS APÓS A ÚLTIMA APLICAÇÃO.

LEITE: O LEITE DOS ANIMAIS TRATADOS SOMENTE DEVE SER CONSUMIDO 36 HORAS APÓS A ÚLTIMA APLICAÇÃO.

#### SUÍNOS:

O ABATE DOS ANIMAIS TRATADOS SOMENTE DEVE SER REALIZADO 3 DIAS APÓS A ÚLTIMA APLICAÇÃO.

#### CAPRINOS:

ABATE: O ABATE DOS ANIMAIS TRATADOS SOMENTE DEVE SER REALIZADO 3 DIAS APÓS A ÚLTIMA APLICAÇÃO.

LEITE: O LEITE DOS ANIMAIS TRATADOS SOMENTE DEVE SER CONSUMIDO 36 HORAS APÓS A ÚLTIMA APLICAÇÃO.

#### AVES:

ABATE: O ABATE DOS ANIMAIS TRATADOS SOMENTE DEVE SER REALIZADO 5 DIAS PARA FRANGOS E 14 DIAS PARA AVES DE POSTURA, APÓS A ÚLTIMA APLICAÇÃO.

**A UTILIZAÇÃO DO PRODUTO EM CONDIÇÕES DIFERENTES DAS INDICADAS NESTA BULA PODE CAUSAR A PRESENÇA DE RESÍDUOS ACIMA DOS LIMITES APROVADOS, TORNANDO O ALIMENTO DE ORIGEM ANIMAL IMPRÓPRIO PARA O CONSUMO.**

### FÓRMULA

Cada 454 g contém:

Sulfato de neomicina ..... 325 g

(equivalente a 227 g de neomicina base)

Sacarose ..... 129 g

### INDICAÇÕES

**Bovinos (exceto bezerros), ovinos, equinos e caprinos:** tratamento e controle das enterites bacterianas (disenterias por bactérias do gênero *Vibrio*, diarreia branca, colibacilose, salmonelose, dirreias causadas por *E. coli*, *Vibrio* e *Salmonella*).

**Suínos e aves:** tratamento e controle das infecções gastrintestinais causadas por germes sensíveis à neomicina, tais como: *E. coli*, *Salmonella*, *Proteus*, *Klebsiela*, *Campylobacter*, *Shigela* e *Vibrio*.

Adicionar à ração, água, leite ou substitutos do leite.

### DOSAGEM E ADMINISTRAÇÃO

#### Pintos

- Controle 10  
- Tratamento 20

#### Aves adultas

- Controle 20  
- Tratamento 40

#### Perus

- 1ª semana 10  
- 2ª à 8ª semana 20  
- 8ª semana em diante 30

#### Suínos

- Controle 10 g / 5 kg peso vivo  
- Tratamento --

#### Bovinos (exceto bezerros) e equinos

Adicionar na água potável ou leite consumido diariamente, 1 colher de sopa (aproximadamente 10 g) para cada 60 kg de peso vivo.

#### Caprinos e ovinos

Adicionar na água potável, 1 colher de sopa (aproximadamente 10 g) para cada 5 kg de peso vivo.

Recomenda-se a continuidade do tratamento por um período não inferior a 48 horas após o desaparecimento do quadro clínico.

### ADVERTÊNCIA

Se os sintomas persistirem após 2 a 3 dias de tratamento, o diagnóstico deverá ser reformulado.

Não administrar a bezerros e equinos destinados ao consumo humano.

Deve ser mantido em sua embalagem original, em temperatura ambiente (15°C a 30°C) e protegido da luz solar.

Manter fora do alcance de crianças e animais domésticos.

### INSTRUÇÕES PARA ABERTURA DA EMBALAGEM

Com uma chave de fenda, corte a tampa nos rasgos indicados, soltando-a com as mãos entre os rasgos ou remova a tampa do bocal e retire o lacre.

VENDA SOB PRESCRIÇÃO DO MÉDICO VETERINÁRIO.