

Avaliação Dermatológica

Dermatites Alérgicas

apoquel
oclacitinib

Escala Analógica Visual*

Instruções: **a)** Fazer uma marca ao lado do nível de coceira ou dermatite apresentadas pelo animal; **b)** Medir o valor determinado pela marca em centímetros; **c)** Comparar os valores obtidos de coceira e dermatite antes e depois do tratamento.

PROPRIETÁRIO - COCEIRA

Coceira extremamente intensa. O cão está se arranhando, mordendo e lambendo quase que continuamente. A coceira praticamente nunca para, independentemente de qualquer outra coisa que esteja acontecendo ao redor do cão.

Coceira intensa. Episódios prolongados de coceira quando o cão está acordado. A coceira ocorre à noite e também quando está comendo, brincando, exercitando-se ou quando está distraído de outra forma.

Coceira moderada. Episódios regulares de coceira quando o cão está acordado. Pode ocorrer coceira à noite a ponto de acordar o cão. Não há coceira ao comer, brincar, exercitar-se ou quando o cão está distraído.

Coceira leve. Episódios mais frequentes de coceira. Pode-se observar episódios ocasionais de coceira à noite. Sem coceira enquanto dorme, come, brinca, exercita-se ou quando está distraído.

Coceira muito leve. Episódios ocasionais de coceira. O cão está coçando-se ligeiramente mais do que antes de o problema começar.

Cão normal. Não há coceira.

VETERINÁRIO - DERMATITE

Dermatite extremamente intensa.
Evidências extensivas de lesão crônica e/ou infecções/escoriações ativas.

Dermatite intensa.

Dermatite moderadamente intensa.

Dermatite moderada.

Dermatite leve.

Cão Normal.

*Hill PB, Lau P, Rybnicek J. Development of an owner-assessed scale to measure the severity of pruritus in dogs. *Veterinary Dermatology*, 18(5):301-308, 2007.