

Veja a rapidez de melhora com **CONVENIA®***†

Fotos: Timothy Smaha, DVM



Antes do tratamento

4 horas após a aplicação

72 horas após a aplicação

Nem semanas.

Nem dias.

Horas

* American Staffordshire Terrier com **dermatite úmida aguda** tratado somente com **CONVENIA®** (cefovecina sódica) na dose de 8 mg/kg.

† O tratamento incluiu uma limpeza inicial da pele com antisséptico tópico diluído.



Para mais informações, acesse www.zoetis.com.br ou fale com um de nossos representantes.

zoetis

CONVENIA® PARA AS Piodermites SUPERFICIAIS E PROFUNDAS. UMA ÚNICA INJEÇÃO PARA O ALÍVIO EM 14 DIAS.



Sua garantia de eficácia independentemente da adesão do cliente ao tratamento.


- Inspirando confiança em você e tranquilidade para os seus clientes.
- Farmacocinética ideal para um efeito antimicrobiano dependente de tempo: concentração acima da CIM por 14 dias.
- Proprietários livres de administrar medicação: simplifica o tratamento de doenças que requerem terapia multimodal.
- Bem tolerado por cães e gatos.



Referências:

1. Petersen AD, Walker RD, Bowman MM, Schott HC 2nd, Rosser EJ Jr. Frequency of isolation and antimicrobial susceptibility patterns of *Staphylococcus intermedius* and *Pseudomonas aeruginosa* isolates from canine skin and ear samples over a 6-year period (1992-1997). *Journal of the American Animal Hospital Association*, 38(5): 407-413, 2002.
2. Sasaki T, Kikuchi K, Tanaka Y, Takahashi N, Kamata S, Hiramatsu K. Reclassification of phenotypically identified *Staphylococcus intermedius* strains. *Journal of Clinical Microbiology*, 45(9): 2770-8, 2007.
3. Perreten V, Kadlec K, Schwarz S, Grönlund Andersson U, Finn M, Greko C, Moodley A, Kania SA, Frank LA, Bemis DA, Franco A, Iurescia M, Battisti A, Duim B, Wagenaar JA, van Duijkeren E, Weese JS, Fitzgerald JR, Rossano A, Guardabassi L. Clonal spread of methicillin-resistant *Staphylococcus pseudintermedius* in Europe and North America: na international multicentre study. *Journal of Antimicrobial Chemotherapy*, 65(6):1145-54, 2010.
4. Carli S, Anfossi P, Villa R, Castellani G, Mengozzi G, Montesissa C. Absorption kinetics and bioavailability of cephalexin in the dog after oral and intramuscular administration. *Journal of Veterinary Pharmacology and Therapeutics*, 22(5):308-313, 1999.
5. CLSI Performance Standards for Antimicrobial Disk and Dilution Susceptibility Tests for Bacteria Isolated from Animals.
6. Zoetis data on file. Estudo interno n° 5561C-36-00-218.
7. Convenia (bula).
8. Zoetis data on file. Estudo interno.

Copyright Zoetis Indústria de Produtos Veterinários Ltda. Todos os direitos reservados. Material Produzido FEVEREIRO 2014. Cod. ZOEMF0045.



TRATAMENTO DAS Piodermites

A DIFERENÇA QUE VOCÊ PODE VER
PARA O ALÍVIO QUE ELE PODE SENTIR.


zoetis

SAC: 0800 011 19 19 | www.zoetis.com.br
Para informações sobre a titularidade do produto consulte o site www.zoetis.com.br.

zoetis

OBTENDO O CONTROLE RÁPIDO E CONTÍNUO DA PIODERMITE

Patogênese das infecções na piodermite superficial



O número de *Staphylococcus pseudintermedius** pode aumentar devido a auto-traumatismo, prurido, inflamação ou alergia.

O aumento de bactérias pode resultar em supercolonização e levar à infecção.

Staphylococcus intermedius*


foi isolado de **88.6%** das amostras de pele submetidas a exame microbiológico durante um período de 6 anos.¹

***Reclassificação do *Staphylococcus* em cães**

Nos últimos anos, pesquisadores reavaliaram isolados bacterianos anteriormente classificados como *S. intermedius*. Utilizando técnicas moleculares, os isolados pertencentes ao grupo *S. intermedius* foram divididos em 3 grupos. *S. pseudintermedius*, e não *S. intermedius*, é a espécie que coloniza e causa infecções em cães e gatos mais frequentemente.^{2,3} No entanto, o perfil de eficácia estabelecido para os antimicrobianos existentes para o tratamento das piodermites não foi afetado.

A PIODERMITE NÃO DEIXA QUALQUER ESPAÇO PARA ERROS

A falta de tratamento efetivo pode resultar em doença prolongada.



*Os cálculos foram baseados em uma dose de 20 mg/kg administrada a cães, com concentrações plasmáticas ficando abaixo da CIM após 10 horas de administração.
** CIM – concentração inibitória mínima
† – Ponto de quebra para a cefalotina, o representante para cefalosporinas de 1ª geração (incluindo a cefalexina), de acordo com o CLSI.

Considere **Convenia®** para aumentar a eficácia independentemente da adesão do cliente ao tratamento.


- Medicamentos orais dependem de adesão ao regime de dosagens para o sucesso do tratamento.
- Uma dose esquecida ou atrasada pode comprometer os resultados – e a satisfação do proprietário.

CONVENIA®: O MECANISMO DE AÇÃO É A CHAVE PARA A SUA EFICÁCIA

Farmacocinética ideal para um antimicrobiano dependente de tempo



Redução significativa nas contagens bacterianas durante todos os 14 dias.⁶



- Efeito bactericida contínuo durante todo o período de 14 dias.⁶
- Rápido início de ação para uma pronta resposta e controle da doença.⁷

SUCESSO DO TRATAMENTO: OS BENEFÍCIOS DA CONSCIÊNCIA TRANQUILA PARA VOCÊ E O SEU CLIENTE.

- O controle rápido da piodermite significa um proprietário satisfeito.
- A resolução rápida da infecção diminui as chances de progressão da doença.

Coloque a ciência de **Convenia®** para trabalhar por você.

Caso clínico: dermatite solar com piodermite superficial secundária. Animal tratado com cefalexina com resposta incompleta. A infecção voltou 2 meses depois em outro local. O animal recebeu uma dose única de **Convenia®**. Resolução completa da piodermite em 8 dias.



Confie na ciência de **Convenia®**:


Eficácia previsível e sustentada por 14 dias – com apenas uma única injeção*.

*Uma segunda injeção subcutânea pode ser administrada a cães 14 dias após a primeira dose.


OTIMIZE O CONTROLE DA PIODERMITE COM A CURA EFETIVA E RÁPIDA NA FONTE DO PROBLEMA



Piodermite profunda



CONVENIA®: FAÇA O NOSSO SUCESSO CLÍNICO A SUA VANTAGEM NA PIODERMITE PROFUNDA.



- Ação rápida para o alívio dos sinais clínicos e sintomas.
- Mantém a concentração do antimicrobiano acima da CIM por 14 dias.

PIODERMITE PROFUNDA

A escolha do antimicrobiano determina a resposta clínica do seu paciente.

Faça o nosso sucesso clínico trabalhar por você.