

**EM CADA 4 HISTÓRIAS, 1 FINAL É TRISTE COM A DIROFILARIOSE.
VOCÊ PODE MUDAR ISSO.**

ProHeart SR-12
Prevenção anual contra o verme do coração.

ProHeart SR-12



DOSAGEM E ADMINISTRAÇÃO



Administre 0,5 mL da suspensão para cada 10 kg de peso (equivalente a 0,5 mg/kg de moxidectina) por via subcutânea. Não administre mais de 3 mL no mesmo local, ou seja, para cães com mais de 60 kg, deve-se considerar mais de um local de aplicação.

1



Abra a embalagem e leia a bula.

2



Utilize uma seringa e agulha 30X12 (1,2 mm x 30 mm) para retirar o volume de veículo estéril requerido (8 mL).

3



Insira a agulha de respiro 15X5 (0,5 mm x 15 mm) no frasco contendo as microesferas.

4



Mantenha a agulha de respiro no frasco e transfira o veículo estéril da seringa para o frasco com as microesferas utilizando a mesma agulha 30x12.

5



Remova as agulhas e agite vigorosamente por aproximadamente **30 segundos** até que se obtenha uma suspensão homogênea. Deixe o frasco descansar por **30 minutos** para dissipar as bolhas de ar.

6



Inverta o frasco e aspire o volume requerido utilizando uma agulha de calibre 0,9 mm para cães ≤ 20 kg e 1,2 mm para cães > 20 kg.

7



Aplique o produto imediatamente após a aspiração do frasco. Se a administração atrasar, agite a seringa delicadamente para manter a suspensão de microesferas homogênea.

8



Aplique o produto pela via subcutânea na região cervical lateral do animal cranial à escápula.

imagens meramente ilustrativas



- Em uma próxima utilização de um frasco já aberto, proceda à agitação conforme o item 5.
- Mantenha o produto dentro da embalagem original sob refrigeração (2 a 8 °C). Não congelar.
- Após a diluição, o produto mantém suas características sob refrigeração por 8 semanas.



PREVENÇÃO ANUAL PARA CÃES CONTRA O VERME DO CORAÇÃO.*




**INDICADO PARA CÃES ACIMA DE 6 MESES
PARA PREVENÇÃO DA DIROFILARIOSE**

Cães entre 6 e 9 meses:
aplicar a primeira dose e repetir
após 9 meses; reforços anuais a
partir da segunda dose.



Cães acima de 9 meses:
aplicar uma única dose e
fazer reforços anuais.



Antes de iniciar a prescrição de **ProHeart SR-12**, recomenda-se realizar a pesquisa de antígeno e/ou microfilárias para detecção da infecção, levando-se em conta o período pré-patente que pode variar de 6 a 9 meses.



**PROHEART SR-12 TAMBÉM É INDICADO PARA CÃES
ACIMA DE 6 MESES CONTRA A ANCILOSTOMOSE**

- **Controla as infecções por *Ancylostoma caninum* presentes no momento da administração e protege contra reinfecções por até 4 meses após a aplicação.**

ProHeart SR-12
Prevenção anual contra o verme do coração.

ProHeart SR-12

*Apresentação injetável
em dose única*

*Valorização da prescrição
veterinária*

*12 meses de proteção em
animais adultos**

*Tranquilidade para o veterinário,
o cão e o proprietário*

*Substitui a utilização dos
preventivos mensais*

Garantia de prevenção completa

*Exclusiva tecnologia de
microesferas*

Inovação ao seu alcance

Amplamente testado

Segurança comprovada

Qualidade Zoetis

Confiança

*Para cães acima de 9 meses de idade.

