VOCÊ PREFERE TRATAR ASSIM...

...OU ASSIM?

NÓS LHE MOSTRAMOS ALGUNS MOTIVOS PARA ESCOLHER TROCOXIL E VOCÊ VAI DESCOBRIR VÁRIOS OUTROS.

Trocoxil®
Mavacoxib

TROCOXIL É O ÚNICO INIBIDOR DE COX-2 (COXIB) DE DOSE ÚNICA MENSAL

- **Controle contínuo da dor:** a chave para evitar a sensibilização central > Alívio efetivo da dor
- **Melhora da adesão ao tratamento:** Com Trocoxil os tutores estão livres da administração diária de comprimidos. Apenas 1 comprimido palatável e saboroso de Trocoxil substitui 30 ou mais comprimidos em tratamentos convencionais > Tranquilidade para seus clientes

EFICÁCIA E EFEITO RÁPIDO

- A eficácia de Trocoxil (2 mg/kg) foi semelhante à do carprofeno (4 mg/kg ao dia) > Eficiência em dose única[1]
- Após 6 semanas de tratamento, os proprietários de cães tratados com Trocoxil relataram uma melhora grande em seus animais > Clientes satisfeitos com o tratamento
- Trocoxil começa a agir em 1 hora e a partir da segunda dose age por 30 dias > Alívio rápido e contínuo da dor

EXCELENTE PERFIL DE SEGURANÇA DEMONSTRADO EM DIVERSOS ESTUDOS

- Em estudo comparativo em cães com osteoartrite, os efeitos colaterais de Trocoxil (2 mg/kg) observados foram semelhantes aos do carprofeno (4 mg/kg ao dia)[1]
- Segurança comprovada em diversos estudos com até 7,5X a dose de bula[1-3]

INDICAÇÕES

- Tratamento da dor e inflamação associada à doença articular degenerativa, quando necessário tratamento por mais de 1 mês em cães.

POSOLOGIA E MODO DE USAR

Dose

2 mg/kg, por via oral, com a dose inicial devendo ser repetida após 14 dias. A partir da segunda dose, as administrações são mensais. Recomenda-se o número máximo de 7 doses, o que equivale a 6,5 meses de tratamento. O produto deve ser adminstrado com uma refeição para melhor absorção.



TROCOXIL: SEU ALIADO NO ALÍVIO CONTÍNUO DA DOR CRÔNICA

1 - Cox SR, Liao S, Payne-Johnson M, Zielinski RJ, Stegemann MR. Population pharmacokinetics of mavacoxib in osteoarthritic dogs. **Journal of Veterinary Pharmacology and Therapeutics**, 34:1-11, 2010.
2 - Krautmann MJ et al. Target animal safety studies of mavacoxib in dogs. **EAVPT** Proceedings, 2009.
3 - Estudo interno 1461N-60-05-695

SAC: 0800 011 19 19 | adm-sac@zoetis.com
www.zoetis.com.br @zoetisbr /zoetisbrasil

zoetis

Copyright Zoetis Indústria de Produtos Veterinários Ltda. Todos os direitos reservados. Material produzido Março/2017.