

zoetis

Guard-Vac LCI/GP

Vacina inativada contra Leptospirose Canina sorovares *canicola*, *icterohaemorrhagiae*, *grippotyphosa* e *pomona* USO VETERINÁRIO

INDICAÇÕES

Para vacinação subcutânea de cães saudáveis a partir de 6 semanas de idade, como auxiliar na prevenção da doença clínica causada por *Leptospira* sorotipos *canicola*, *icterohaemorrhagiae*, *grippotyphosa* e *pomona*. Não se destina ao uso como diluente de vacinas vivas.*

A Leptospirose é uma doença grave causada por uma bactéria, *Leptospira* spp., disseminada por todo o mundo e reconhecida pela Organização Mundial de Saúde (O.M.S.) como uma das zoonoses mais prevalentes.

O cão infecta-se facilmente através do contato com a água contaminada pela urina de várias espécies animais, que podem conter as *Leptospiras* patogênicas. A Leptospirose é uma enfermidade infecto-contagiosa de diagnóstico difícil e sinais clínicos nem sempre patognomônicos, principalmente no início do processo infeccioso, portanto, a prevenção é a medida mais indicada.

A vacinação de cães com **Guard-Vac LCI/GP** reduz

significativamente a incidência, severidade e desenvolvimento de sinais clínicos pelos animais.

* Se for desejável usar estes sorotipos de *Leptospira* em combinação com vacinas vivas modificadas, existem produtos disponíveis contendo *Leptospira canicola*, *Leptospira grippotyphosa*, *Leptospira icterohaemorrhagiae* e *Leptospira pomona*, especificamente concebidos para este objetivo.

POSOLOGIA E MODO DE USAR

Aplicar uma dose de 1 mL por via subcutânea, assepticamente. Uma segunda dose deve ser aplicada de duas a três semanas após a primeira vacinação. Um programa de vacinação recomendado pode ser iniciado às 6 semanas de idade. Filhotes com 6 semanas de idade ou mais velhos podem ser revacinados a cada 2 a 3 semanas, até no mínimo 12 semanas de idade. Recomenda-se a revacinação anual. **AGITAR BEM ANTES DE USAR.**

PRECAUÇÕES:

- O uso concomitante com substâncias antimicrobianas ou antiinflamatórias poderá interferir no desenvolvimento e manutenção da resposta imune após a vacinação.
- Conservar entre 2 °C e 8 °C, ao abrigo da luz.
- EVITAR CONGELAMENTO.
- Usar todo o conteúdo do frasco após aberto.
- Em casos de reação anafilática, administrar epinefrina ou equivalente.
- Apenas animais saudáveis devem ser vacinados. Caso o animal esteja incubando a doença no momento da vacinação, a eficácia da vacina pode ser prejudicada.
- A resposta adequada à vacinação é diretamente ligada à

competência imunológica de cada animal.

- Mantenha fora do alcance de crianças. Incinerar o frasco e a sobra do produto não utilizado.
- Contém Timerosal e Gentamicina como agentes conservantes.
- A vacinação deverá ser precedida por um minucioso exame clínico, realizado por um Médico Veterinário.

APRESENTAÇÃO

Caixa contendo 25 frascos de 1 mL de vacina contra Leptospirose.

Proprietário: Zoetis Inc.

Licenciado no Ministério da Agricultura sob o nº 8.771 em 19/01/2004

PRODUTO IMPORTADO

Validade do Produto: 24 meses após a data de fabricação