

Excenel®

USO VETERINÁRIO

Para uso intramuscular em bovinos, suínos e eqüinos, uso intramuscular ou subcutâneo em aves e uso subcutâneo em cães.

ATENÇÃO: OBEDECER AOS SEGUINTES PERÍODOS DE CARENÇA
BOVINOS: ABATE: NÃO HÁ NECESSIDADE DE PERÍODO DE RETIRADA PARA O ABATE.
LEITE: NÃO HÁ NECESSIDADE DE PERÍODO DE RETIRADA PARA CONSUMO DE LEITE.
SUÍNOS: ABATE: O ABATE DOS ANIMAIS TRATADOS COM ESTE PRODUTO SOMENTE DEVE SER REALIZADO 01 DIA APÓS A ÚLTIMA APLICAÇÃO.

A UTILIZAÇÃO DO PRODUTO EM CONDIÇÕES DIFERENTES DAS INDICADAS NESTA BULA PODE CAUSAR A PRESENÇA DE RESÍDUOS ACIMA DOS LIMITES APROVADOS, TORNANDO O ALIMENTO DE ORIGEM ANIMAL IMPRÓPRIO PARA O CONSUMO.

Fórmula

Frasco de 4 g com diluente de 80 mL:
Cada 80 mL contém:
Ceftiofur sódico 4 g
Veículo q.s.p. 80 mL
Excenel contém o sal sódico de ceftiofur, um antibiótico com largo espectro de ação, pertencente ao grupo das cefalosporinas. É ativo contra bactérias Gram-positivas e Gram-negativas, incluindo cepas produtoras de beta-lactamase. Como outras cefalosporinas, ceftiofur é bactericida "in vitro", interferindo na síntese da parede bacteriana.

Indicações

Bovinos: tratamento de pneumonias e febre do transporte (*Pasteurella haemolytica*, *P. multocida*, *Haemophilus somnus*) e enterites (*Salmonella* spp).
Suínos: tratamento e controle da doença respiratória bacteriana (pleuropneumonia e pneumonia bacteriana suína) associada a *Actinobacillus* (*Haemophilus*) *pleuropneumoniae*, *Pasteurella multocida*, enterites (*Salmonella choleraesuis*),

meningoencefalite (*Streptococcus suis* tipo 2) e infecções genitourinárias.

Aves: controle da mortalidade na primeira semana, associada a *Escherichia coli* e *Staphylococcus aureus* susceptíveis ao ceftiofur.

Eqüinos: tratamento de infecções respiratórias bacterianas associadas a *Streptococcus zooepidemicus*, *Streptococcus equi*, *Pasteurella* spp, *Staphylococcus* spp e *Escherichia coli*.
Cães: tratamento de infecções urinárias associadas a *Escherichia coli* e *Proteus mirabilis*.

Doses e modo de usar

Retirar o diluente com uma seringa estéril. Injetar o conteúdo total do diluente no frasco com o pó estéril e agitar.

Posologia

Administrar na dose de 1 - 3 mg de Ceftiofur/kg de peso, ou a critério do Médico Veterinário. Repetir o tratamento após intervalo de 24 horas por 3 dias consecutivos. Administrar por via intramuscular em bovinos, suínos e eqüinos, por via intramuscular ou subcutânea em aves e por via subcutânea em cães.

Bovinos (1mg/kg de peso corporal)
Frasco de 4 g com 80mL: 1mL da solução reconstituída (50 mg de ceftiofur) para cada 50 kg de peso corporal.
Fazer uma aplicação a cada 24 horas, durante 3 dias consecutivos.

Suínos
Suínos pós-desmame (1 mg/kg de peso corporal)
Frasco de 4 g com 80 mL: 1 mL da solução reconstituída (50 mg de ceftiofur) para cada 50 kg de peso corporal. Repetir o tratamento após intervalo de 24 horas por 3 dias consecutivos.

Suínos em aleitamento (2 mg/kg de peso corporal)
Frasco de 4 g com 80 mL: 0,2 mL da solução reconstituída (10 mg de ceftiofur) para cada 5 kg de peso corporal. O programa de aplicação será a critério do Médico Veterinário.
As dosagens e o tempo de tratamento podem ser modificados de acordo com a gravidade do caso (temperatura,

freqüência respiratória, etc.) ou recomendação do Médico Veterinário.

Aves

Administrar na dose de 2 mg/kg de peso corporal.
Para pintos de 1 dia: Administrar na dose de 0,08 a 0,20 mg/pinto, por injeção subcutânea, na região da nuca.
Para frascos de 4g com 80 mL: Administrar 1 mL da solução reconstituída para cada 625 pintos de 1 dia de vida ou 1,6 mL/1000 pintos.

Eqüinos

Administrar na dose de 2,0 a 4,0 mg/kg peso corporal, a cada 24 horas. Deve-se administrar um volume máximo de 10 mL em cada local de injeção. O tratamento deve ser continuado por 48 h após o desaparecimento dos sintomas.

Cães

Administrar por via subcutânea, na dose de 2 mg/kg peso corporal, a cada 24 horas (para frascos de 4 g reconstituídos com 80 mL de diluente: administrar 0,4 mL da solução reconstituída para cada 10 kg de peso vivo). O tratamento deve ser continuado por 5 a 14 dias, a critério do Médico Veterinário.

Contra-indicações

O uso de EXCENEL é contra-indicado para animais hipersensíveis à droga.

Advertências

Penicilinas e Cefalosporinas podem causar reações alérgicas em indivíduos sensíveis. Exposições tóxicas a alguns antimicrobianos, inclusive Ceftiofur, podem provocar reações alérgicas moderadas ou graves em alguns indivíduos.
Exposições repetidas ou prolongadas podem induzir à sensibilização. Evitar contato direto do produto com a pele, olhos, boca e roupas.
Pessoas com hipersensibilidade conhecida à penicilina ou cefalosporinas devem evitar contato com o produto.
Em caso de acidentes oculares, lavar os olhos com bastante água por 15 minutos. Em acidentes tópicos, lavar a pele com água e sabão. Retirar a roupa contaminada. Se ocorrerem reações

alérgicas (erupção na pele, urticária, dificuldade respiratória), procurar cuidados médicos.

Precauções

Ainda não foi estabelecida a segurança do ceftiofur em cães reprodutores ou cadelas gestantes.

Conservar o produto sob refrigeração entre 2°C e 8°C e fora do alcance de crianças e de animais domésticos. Após sua reconstituição, o produto deverá ser mantido por 7 dias à temperatura de 4°C ou por 12 horas até 30°C. Quando congelado o produto reconstituído poderá ser mantido por 8 semanas. Recomenda-se apenas um descongelamento.
Venda sob prescrição, orientação e aplicação de Médico Veterinário. Licenciado no Ministério da Agricultura sob nº 3982 em 28/04/92.

Apresentação

Excenel é disponível em frasco com 4 g de ceftiofur sódico acompanhado de frasco com 80 mL de diluente.

Validade do Produto: 36 meses após a data de fabricação.