

zoetis

# Provac®-AE

Vacina contra Encefalomielite Aviária

Vírus vivo atenuado

Produzida em ovos SPF/COFAL Negativo

## USO VETERINÁRIO

### Ler atentamente as instruções antes de usar.

Conservar à temperatura entre 2°C a 8°C. Administrar imediatamente após a reconstituição do produto. Não conservar sobras para utilização posterior. Queimar o recipiente e todo o conteúdo não utilizado. Vacinar somente aves saudas. Esta vacina, quando usada conforme instruções, é eficaz para imunizar reprodutoras e poedeiras contra a Encefalomielite Aviária.

**Atenção:** Cepa patogênica para embriões. Não vacinar aves na fase de produção de ovos. Os lotes vacinados deverão ser isolados dos lotes de aves não vacinadas e em fase de produção de ovos por um período de 4 semanas.

Contém penicilina e estreptomicina.

### Vias de Administração e Modo de Usar:

Para uso na água de beber. Recomenda-se para reprodutoras e frangas de reposição para postura, entre 10 semanas de idade e até 4 semanas antes da postura.

Dissolver o estabilizador (pó) em água limpa e fresca, não clorada, juntar a seguir a vacina e misturar bem. Observar em seguida a diluição para 1.000 aves:

1.000 doses	40 litros
-------------	-----------

### Precauções:

1. Aves doentes não devem ser vacinadas.
2. Suspender o uso do medicamentos e desinfetantes na água de beber, de preferência 72 horas antes e 24 horas depois da vacinação.
3. De preferência não utilizar bebedouros metálicos.
4. Estimular a sede das aves através da retirada da água durante 1 ou 2 horas antes da administração da vacina. O período de jejum hídrico depende das condições climáticas.
5. Não utilizar outra água de bebida até que a água contendo a vacina tenha sido totalmente consumida.
6. A água a ser utilizada para preparação da vacina deve estar isenta de tratamento com desinfetantes, detergentes e não conter cloro, ferro nitratos, etc.
7. Nunca usar menos de uma dose por ave. Para número de animais entre dosagens-padrão, deve ser usada a dosagem seguinte mais alta. A solução de vacina deverá ser distribuída em diversos bebedouros, de modo que todas as aves tenham oportunidade de beber. É recomendável que a solução vacinal seja consumida em um período máximo de uma hora após a preparação. Evitar condições de stress durante a vacinação.
8. Os bebedouros devem estar limpos e sem resíduos de sabão, detergentes, desinfetantes e outros produtos químicos que possam ser nocivos à vacina.
9. Não expor os bebedouros com vacina à luz direta do sol.
10. É recomendável realizar monitoramento sorológico das aves vacinadas, realizando ajustes no programa vacinal, conforme orientação do Médico Veterinário.

**Apresentação:** Caixa contendo 10 frascos de vidro ou plástico com 5 mL (500 doses) ou 10 mL (1000 doses).

### Advertências:

Manter fora do alcance de crianças e animais domésticos.  
O uso deste produto deverá ser suspenso 30 dias antes do abate.  
Incinerar os frascos vazios e o conteúdo não utilizado.

**Validade do produto:** 12 meses após a data de fabricação.

Licenciado no Ministério da Agricultura sob nº 0850, em 02/03/79.

zoetis

Proprietário e Fabricante:

Zoetis Indústria de Produtos Veterinários Ltda.

Rua Luiz Fernando Rodriguez, 1701

CEP 13064-798 - Campinas - SP

CNPJ 43.588.045/0001-31 - Indústria Brasileira

Responsável Técnico: Dr. Renato Beneduzzi Ferreira

Médico Veterinário - CRMV-SP nº 1695

SAC 0800 011 1919