

A-D-E INJETÁVEL

Emulsificável

USO VETERINÁRIO

ATENÇÃO: OBEDECER AOS SEGUINTE PERÍODOS DE CARÊNCIA

BOVINOS: ABATE: O PRODUTO NÃO REQUER PERÍODO DE CARÊNCIA PARA O ABATE DE BOVINOS TRATADOS.

CAPRINOS: ABATE: O PRODUTO NÃO REQUER PERÍODO DE CARÊNCIA PARA O ABATE DE CAPRINOS TRATADOS.

OVINOS: ABATE: O PRODUTO NÃO REQUER PERÍODO DE CARÊNCIA PARA O ABATE DE OVINOS TRATADOS.

A UTILIZAÇÃO DO PRODUTO EM CONDIÇÕES DIFERENTES DAS INDICADAS NESTA BULA PODE CAUSAR A PRESENÇA DE RESÍDUOS ACIMA DOS LIMITES APROVADOS, TORNANDO O ALIMENTO DE ORIGEM ANIMAL IMPRÓPRIO PARA O CONSUMO.

FÓRMULA:

Cada 100 mL contém:

Vitamina A 25.000.000 UI

Vitamina D₃ 7.000.000 UI

Vitamina E 7.000 UI

Veículo q.s.p. 100 mL

Descrição:

A-D-E Injetável Emulsificável é um produto estéril e pronto para uso.

Contém as Vitaminas A, D, e E em quantidades equilibradas, capazes de atender as exigências orgânicas dos animais, constituindo, pois, eficaz tratamento quer curativo, quer profilático, nas hipovitaminoses A, D e E.

O produto com ação emulsificante contribui para melhorar, acelerar e potencializar a absorção das vitaminas A, D e E proporcionando um considerável aumento nas suas reservas hepáticas e disponibilidade orgânica.

Indicações

A-D-E Injetável Emulsificável é indicado na prevenção e tratamento de avitaminoses A, D e E.

Modo de uso e dosagens:

A-D-E Injetável Emulsificável é indicado por via intramuscular ou subcutânea, nas seguintes doses:

Bovinos:

Animais jovens: 1 mL para cada 50 Kg de peso, cada 45 dias.

Recria e engorda: 5 mL/cabeça, cada 120 dias.

Animais em confinamento, reprodução, gestação ou lactação: 5 mL/cabeça, cada 75 dias.

Ovinos e caprinos:

Animais jovens: 0,5 mL/cabeça. Reprodutores: 2 mL/cabeça, cada 75 dias.

ATENÇÃO: Não se recomenda o uso em cães e gatos.

Precaução: Deve-se observar que em determinadas regiões, podem ocorrer casos raros de animais que em seguida à aplicação de medicamentos injetáveis contendo vitaminas, podem apresentar reações de hipersensibilidade individuais (hipersalivação, incoordenação dos movimentos, edema das mucosas ocular e vaginal), quem podem desaparecer espontaneamente em alguns minutos. Quando se trata de animais hipersensíveis, recomendamos aplicar, via intramuscular ou endovenosa, produtos anti-histamínicos (Prometazina 100 a 150 mg, ou Fenegan, 2 a 3 ampolas de 2 mL), e ainda corticosteroides, nas dosagens recomendadas pelo fabricante.

CUIDADOS: Limpar e desinfetar a seringa, a agulha e o local da aplicação.

Conservar em local seco e fresco entre 15°C e 30°C, ao abrigo da luz solar. Após aberto, usar todo o conteúdo.

Agitar antes de usar.

MANTENHA FORA DO ALCANCE DE CRIANÇAS E DE ANIMAIS DOMÉSTICOS.

VENDA E APLICAÇÃO SOB ORIENTAÇÃO DO MÉDICO VETERINÁRIO.

Validade do produto: 24 meses após a data de fabricação.

Apresentação: frascos contendo 50 e 250 mL.

Responsável Técnica: Vanessa da Silva Lopes - CRMV SP nº 28.204

Licenciado no Ministério da Agricultura desde 29/05/1972. Registrado no SIPEAGRO sob o nº SP 000072-8.000050.

zoetis

Proprietário e Fabricante: Zoetis Indústria de Produtos Veterinários Ltda.

R. Luiz Fernando Rodriguez, 1701 - CEP 13064-798 - Campinas - SP

CNPJ nº 43.588.045/0001-31 - Indústria Brasileira

SAC 0800 011 1919

40050520 / GQ-029