ABORDAGEM DIAGNÓSTICA PARA CÃES COM PRURIDO

CÃO COM PRURIDO

ECTOPARASITAS
Pulgas, carrapatos, *Sarcoptes, Demodex, Cheyletiella*

INFECÇÃO SECUNDÁRIA
Piodermite
Malassezia

TESTES
- pente/escova
- algodão/papel molhado
- raspado de pele
- avulsão de pelos tricograma

TESTES
- fita
- haste de algodão
- "imprinting" lesão
- citológico

TRATE

PRURIDO PERSISTE

DERMATITE ALÉRGICA

ALÍVIO

AVALIAÇÃO INICIAL com suspeita de dermatite alérgica

Prescreva Apoquel

Trate pulgas e carrapatos

REAVALIAÇÃO

NOVO EXAME CLÍNICO e REAVALIAÇÃO

Interrompa o uso de Apoquel

Determine a resposta

Novo exame e reavaliação

- Ausência de prurido (diagnóstico de dermatite alérgica a picada de ectoparasitas - DAPE)
- Retorno do prurido

Mantenha o tratamento contra ectoparasitas

INVESTIGAÇÕES ADICIONAIS

Reintroduza Apoquel por um período

Testes diagnósticos adicionais

Alergia alimentar (dieta de eliminação)

- Ausência de prurido (diagnóstico de alergia alimentar)
- Retorno do prurido

MANUTENÇÃO

TRATAMENTO EM LONGO PRAZO

Reintroduza Apoquel ou introduza Cytopoint

Diagnóstico de dermatite atópica

Tratamento multimodal de longo prazo para controle (parasitas, barreira cutânea, dieta etc.)

Monitoramento periódico (hemograma e perfil bioquímico)

---

apoquel oclacitinib

Apoquel é uma boa opção:
- Durante a triagem diagnóstica
- Quando os tutores preferem medicações por via oral
- Se os retornos mensais não são possíveis
- Nas crises de prurido

---

apoquel oclacitinib ou **CYTOPOINT** lokivetmab

Apoquel ou Cytopoint podem ser considerados:
- Para evitar os efeitos adversos de outras terapias
- Na dermatite atópica crônica ou sazonal
- Diante de doenças concomitantes nas quais outros medicamentos estão sendo utilizados

---

CYTOPOINT lokivetmab

Cytopoint é uma boa opção:
- Quando a conveniência de uma medicação a cada 4-8 semanas é valorizada
- Para os animais difíceis de medicar por via oral
- Em animais com menos de 1 ano de idade

©Copyright Zoetis Indústria de Produtos Veterinários Ltda. Todos os direitos reservados. Material produzido em novembro/2018. Cód.: 30002310. #MM-04197

COMO UTILIZAR APOQUEL E CYTOPOINT NAS DERMATITES ALÉRGICAS

SUSPEITA DE DERMATITE ALÉRGICA

DIAS: 0 — 21 | 40 — 61 | 70 — 91 | 100

1 apoquel oclacitinib

Trate a **DAPE***

revolution® ou Simparic sarolaner

MELHORA?

Sim: DAPE* confirmada
(manter controle contínuo de ectoparasitas)

Não: dieta de eliminação

Apoquel pode ser utilizado nas primeiras 3 semanas junto ao tratamento com antiparasitários para aliviar os sintomas de DAPE* até a eliminação completa dos ectoparasitas e dessensibilização do animal. É necessário interromper o tratamento para avaliar o prurido sem o efeito de Apoquel.

*DAPE – dermatite alérgica a picada de ectoparasitas.
**Alguns animais podem apresentar melhora apenas parcial à dieta de eliminação. Esses animais podem ser considerados portadores de dermatite atópica responsiva a alimentos, e devem seguir o tratamento para dermatite atópica e controle de dieta.

2 apoquel oclacitinib

Dieta de **eliminação****

revolution® ou Simparic sarolaner

MELHORA?

Sim: alergia alimentar confirmada
(manter dieta e controle de ectoparasitas)

Não: dermatite atópica confirmada

Apoquel pode ser utilizado durante as dietas de eliminação para aliviar o prurido e facilitar a adesão do tutor à mudança de alimentação. Após 3 semanas de dieta e tratamento com Apoquel, recomenda-se interromper o produto para avaliar o prurido. Se o cão não apresentar prurido, confirma-se o diagnóstico de alergia alimentar. Caso ele apresente, recomenda-se manter a dieta e voltar com Apoquel por mais 3 semanas, interrompendo-se a seguir para avaliar o prurido. Isto é necessário porque alguns animais podem precisar de até 8 semanas para exibir resposta à dieta.

3 apoquel oclacitinib ou CYTOPOINT lokivetmab

Dermatite **atópica**

revolution® ou Simparic sarolaner

- Controlar o prurido
- Evitar alterações de dieta
- Evitar exposição a alérgenos
- Manter controle contínuo de ectoparasitas
- Tratar infecções secundárias sempre que necessário (bactérias e *Malassezia*)
- Restabelecer a barreira cutânea

Caso não seja possível identificar e eliminar os alérgenos desencadeadores do prurido, o tratamento com Apoquel ou Cytopoint pode ser mantido a critério do médico veterinário, em conjunto com as demais medidas para controle da dermatite atópica.

SAC: 0800 011 19 19 | adm-sac@zoetis.com
www.zoetis.com.br | @zoetisbr /zoetisbrasil