PERGUNTE AO SEU MÉDICO-VETERINÁRIO SOBRE LIBRELA E A REVOLUÇÃO NO TRATAMENTO DA OSTEOARTRITE CANINA!

- **LIBRELA** é uma terapia inovadora com anticorpos monoclonais para o controle da dor associada à osteoartrite canina.
- O tratamento com **LIBRELA** é feito com uma única aplicação por mês.
- **LIBRELA** pode ser usado a longo prazo, mesmo em cães que tenham outras enfermidades.[3]
- **LIBRELA** é seguro, sem diversos efeitos colaterais associados a outros medicamentos.[3]

Librela®
Bedinvetmab

Copyright Zoetis Indústria de Produtos Veterinários Ltda. Todos os direitos reservados. Material produzido em 01/23. # MM-24661.

Referências:

1. Johnston SA. Osteoarthritis: joint anatomy, physiology and pathobiology. Vet Clin N Am Small Anim Pract 1997;27:699-723.
2. Wright A, Amodie DM, Cernicchiaro N, Lascelles BDX, Pavlock AM. Diagnosis and treatment rates of osteoarthritis in dogs using a Health Risk Assessment (HRA) or Health Questionnaire for Osteoarthritis in general veterinary practice. ISPOR. 2019.
3. Corral MJ. A prospective, randomized, blinded, placebo-controlled multisite clinical study of bedinvetmab, a canine monoclonal antibody targeting nerve growth factor, in dogs with osteoarthritis. Veterinary Anaesthesia and Analgesia 2021 Nov; 48; 943-955.

zoetispetsbrasil | zoetisbrasil
www.zoetis.com.br | adm-sac@zoetis.com | 0800 011 19 19

zoetis

SERÁ QUE O SEU CÃO SENTE DOR?

Librela®
Bedinvetmab

MANDA A DOR DO SEU CÃO PASSEAR

DOR EM CÃES

A dor em cães pode ser causada por inúmeras doenças e **uma das principais é a osteoartrite.**

É uma doença que impacta a vida do seu cão de diversas formas, causando dor, redução na mobilidade, aumento de peso, alterações comportamentais e **diminuição significativa na qualidade de vida**.[1]

VOCÊ SABIA?

É extremamente importante que você saiba reconhecer os sinais e as alterações comportamentais associadas à osteoartrite e procure ajuda do médico-veterinário para **controlar a dor, retardar a progressão da doença e melhorar substancialmente a qualidade de vida** do seu cão.

A dor associada à osteoartrite pode manifestar-se de várias formas:

MAIOR LENTIDÃO NA ATIVIDADE FÍSICA	AUMENTO DOS PERÍODOS DE REPOUSO	REDUÇÃO DA INTERAÇÃO COM OUTROS ANIMAIS E/OU TUTORES
DIFICULDADE NA LOCOMOÇÃO	DIFICULDADE EM LEVANTAR APÓS PERÍODOS DE REPOUSO	AGRESSIVIDADE
MANCAR AO CAMINHAR	NECESSIDADE DE PARAR DURANTE ATIVIDADE FÍSICA	ALTERAÇÃO NO PADRÃO DO SONO

4 em cada 10 cães

apresentam sinais de dor associada à osteoartrite[2]

SERÁ QUE O SEU CÃO TEM OSTEOARTRITE?

Cães de todas as idades, raças e tamanhos podem desenvolver osteoartrite. Conhecer os sintomas vai ajudá-lo a perceber se o seu cão precisa ser avaliado pelo médico-veterinário.

Este *checklist* vai ajudar o profissional a identificar quaisquer comportamentos do seu cão que possam ser indicativos da presença de osteoartrite.

Considerando a atividade do seu cão nos últimos 7 dias, assinale na seguinte lista os comportamentos que observou:

Atualmente existem tratamentos inovadores que podem melhorar significativamente a qualidade de vida dos cães com osteoartrite. O diagnóstico precoce associado a um tratamento adequado são fundamentais para retardar a progressão da doença.

DÊ O PRIMEIRO PASSO PARA MELHORAR A QUALIDADE DE VIDA DO SEU CÃO!