

Prepare uma solução fresca diariamente e use-a como única fonte de água potável.  
Armazenamento: Deve ser mantido em sua embalagem original, em temperatura ambiente (15°C a 30°C) e protegido da luz solar. Manter fora do alcance de crianças.

**BMD®**  
Solúvel 50%

### Modo de usar e via de administração:

#### Administre o pó via oral através de água de

**bebida:** Para enterite necrótica em frangos, administre continuamente, por 5 a 7 dias, ou enquanto persistirem os sintomas, então, reduza a medicação para níveis de controle, na dose de 50 mg de BMD® solúvel 50% por litro de água de bebida.

Para enterite transmissível dos perus, administre continuamente enquanto perdurarem os sintomas clínicos. Para disenteria suína, inicie a medicação aos primeiros sinais da doença ou nas épocas de maior desafio. Administre a medicação continuamente por 7 dias ou até o desaparecimento dos sintomas. O tratamento não poderá exceder a 14 dias.

#### Restrição de uso

**Atenção:** não deve ser usado em suínos pesando acima de 100 kg.

**Venda sob prescrição do Médico Veterinário.**  
Licenciado no Ministério da Agricultura sob número 6.518 em 05/05/98.

#### ATENÇÃO: OBEDECER AOS SEGUINTE PERÍODOS DE CARÊNCIA

##### AVES

ABATE: O PRODUTO NÃO REQUER PERÍODO DE CARÊNCIA PARA O ABATE DE AVES TRATADAS

##### SUÍNOS

ABATE: O PRODUTO NÃO REQUER PERÍODO DE CARÊNCIA PARA O ABATE DE SUÍNOS TRATADOS

A UTILIZAÇÃO DO PRODUTO EM CONDIÇÕES DIFERENTES DAS INDICADAS NESTE RÓTULO-BULA PODE CAUSAR A PRESENÇA DE RESÍDUOS ACIMA DOS LIMITES APROVADOS, TORNANDO O ALIMENTO DE ORIGEM ANIMAL IMPRÓPRIO PARA O CONSUMO HUMANO

**PART.:**

Vide marcação.

**VENC.:**

## Bacitracina metileno disalicilato USO VETERINÁRIO

Para água de bebida de aves e suínos

# BMD®

## Solúvel 50%

#### Fórmula:

Cada 100 g contém:  
Bacitracina metileno disalicilato 50 g  
Excipiente q.s.p. 100 g

#### Indicações:

**Frangos de corte:**  
Para controle e tratamento da enterite necrótica causada por *Clostridium perfringens*

**Perus:** Para controle da enterite transmissível dos perus causada por *Clostridium* spp.

**Suínos:**  
Para tratamento da disenteria suína associada ao *Treponema hyodysenteriae*

#### Apresentação:

Sachê aluminizado contendo 100 g

#### Conteúdo:

100 gramas

## zoetis

Representante Exclusivo no Brasil, Importador e Distribuidor:

Zoetis Indústria de Produtos Veterinários Ltda.

Rua Luiz Fernando Rodriguez, 1701

CEP 13064-798 - Campinas - SP

CNPJ 43.588.045/0001-31

SAC 0800 011 1919

Responsável Técnica:

Vanessa da Silva Lopes - CRMV SP nº 28.204

Proprietário:

Zoetis Inc.

333 Portage Street - Kalamazoo, MI – EUA

Fabricante:

Zoetis LLC

400 State Street, Chicago Heights, Illinois 60411 - EUA

PRODUTO IMPORTADO

40041781

### Posologia

Espécie	Doença	Controle	Quantidade/ 500 l de água	Tratamento	Quantidade/ 500 l de água
Frangos de corte	Enterite necrótica	50 mg de BMD® Solúvel 50% por litro de água de bebida	¼ do sachê	100 a 200 mg de BMD® Solúvel 50% por litro de água de bebida	½ a 1 sachê
Perus	Enterite transmissível			200 mg de BMD® Solúvel 50% por litro de água de bebida	1 sachê
Suínos	Disenteria suína			500 mg de BMD® Solúvel 50% por litro de água de bebida	2 e ½ sachês