

Coriza Gel-3

Bacterina contra Coriza Infecciosa das aves

Suspensão inativada trivalente de *Haemophilus paragallinarum* adsorvida em gel de alumínio.

USO VETERINÁRIO

zoetis

Conteúdo: 500 mL (1.000 doses)

Proprietário e Fabricante:

Zoetis Indústria de Produtos Veterinários Ltda.

Rua Luiz Fernando Rodriguez, 1701

CEP 13064-798 - Campinas - SP

CNPJ 43.588.045/0001-31

Indústria Brasileira

SAC 0800 011 1919

Advertências:

Após o uso, queimar o recipiente e eventuais sobras do produto.

Não reutilizar a embalagem.

Vacinar somente aves sadias.

Não vacinar durante os 21 dias que antecedem o abate.

Manter fora do alcance de crianças e animais domésticos.

Licenciado no Ministério da Agricultura sob nº 3547 em 17/12/90.

Validade do produto: 24 meses após a data de fabricação.

Responsável Técnica: Vanessa da Silva Lopes

CRMV SP nº 28.204

PART.:

FABR.:

VENC.:



Indicações:

Vacinação de galinhas poedeiras e reprodutoras com idade mínima de 5 semanas. Respeitar o intervalo de no mínimo 8 semanas entre a primo-vacinação e o reforço.

Administração e Modo de Usar:

Conservar à temperatura entre 2°C e 8°C.

Não permitir o congelamento.

Antes de usar, deixar o produto atingir a temperatura ambiente (22°C).

Agitar bem o frasco antes e durante o uso.

Utilizar agulha, seringas e equípos esterilizados.

Desinfetar a tampa de borracha com algodão embebido em álcool antes de introduzir a agulha no frasco.

Administrar 0,5 mL/ave por via intramuscular, no peito ou na coxa.

Durante a vacinação, trocar a agulha a cada 500 aves.

Uma vez aberto o frasco, usar todo o conteúdo.