

Contém 10 frascos de 2.500 doses

# Poulvac® E. coli

## Vacina viva contra *Escherichia coli*

### USO VETERINÁRIO

Recomenda-se a vacinação por via spray, em aves saudáveis a partir do primeiro dia de vida, como auxiliar na prevenção da enfermidade causada pela *Escherichia coli*. Em aves de vida longa, administrar uma dose de reforço entre a 12ª e 14ª semana de idade ou de acordo com a recomendação do Médico Veterinário responsável.

Ver o verso para instruções completas.

Conservar à temperatura entre 2°C e 8°C, ao abrigo da luz. Não vacinar durante os 21 dias que antecedem o abate. Uma vez aberto o frasco, usar todo o conteúdo. Após o uso, incinerar o frasco e eventuais sobras do produto. É proibida a venda deste produto reembalado. Não aceitar se o selo estiver violado.

zoetis

PART.:

FABR.:

VENC.:

zoetis

Poulvac® E. coli

FPO : EAN-13



7 898049 714018

40040305

Licenciado no Ministério da Agricultura sob o nº 9546 em 22/02/2010.

#### Proprietário e Fabricante:

Zoetis Inc.  
2000 Rockford Road  
Charles City, Iowa, USA.  
U.S. Vet. License No. 190

#### PRODUTO IMPORTADO

**Representante Exclusivo no Brasil, Importador e Distribuidor:**  
**Zoetis Indústria de Produtos Veterinários Ltda.**

Rua Luiz Fernando Rodriguez, 1701  
CEP 13064-798 - Campinas - SP  
CNPJ 43.588.045/0001-31  
**SAC 0800 011 1919**

Responsável Técnica: Vanessa da Silva Lopes - CRMV SP nº 28.204

**Poulvac® E. coli - Vacina viva contra *Escherichia coli*** 

**USO VETERINÁRIO**  
**Composição:** Cada dose do produto contém suspensão avirulenta de *Escherichia coli* EC34195, título na liberação  $\geq 6,5 \times 10^8$  UFC/dose.

O produto é indicado para vacinação de galinhas reprodutoras, galinhas poedeiras comerciais e frango de corte.

Recomenda-se a vacinação por via spray, em aves saudáveis a partir do primeiro dia de vida, como auxiliar na prevenção da enfermidade causada pela *Escherichia coli*. Em aves de vida longa, administrar uma dose de reforço entre a 12ª e 14ª semana de idade ou de acordo com a recomendação do médico veterinário responsável.

**Administração por spray:**

Utilizar vacinadoras automáticas (gabinetes) ou aspersores manuais. Abrir o frasco da vacina e adicionar água destilada até a metade do mesmo. Fechar e agitar até dissolução total do produto. Transferir a vacina diluída para um recipiente limpo e completar com água fresca e não clorada.

Transferir a solução vacinal para o recipiente acoplado à cabine spray ou ao tanque do pulverizador (aspersores manuais).

Administrar uma dose de vacina por ave.

**Precauções:** Recomenda-se vacinar simultaneamente todas as aves sensíveis de um plantel.

Durante 10 a 14 dias após a vacinação, evitar o trânsito entre áreas de aves vacinadas e não vacinadas.

Deve ser evitado o uso concomitante de antibióticos com esta vacina.

**Apresentação:** Caixas contendo 10 frascos de 2.500 doses.

**Validade do Produto:** 24 meses após a data da fabricação.

Licenciado no Ministério da Agricultura sob o nº 9546 em 22/02/2010.

**Proprietário e Fabricante:**

Zoetis Inc.  
2000 Rockford Road  
Charles City, Iowa, USA.  
U.S. Vet. License No. 190

**PRODUTO IMPORTADO**

**Representante Exclusivo no Brasil, Importador e Distribuidor:**

**Zoetis Indústria de Produtos Veterinários Ltda.**

Rua Luiz Fernando Rodriguez, 1701

CEP 13064-798 - Campinas - SP

CNPJ 43.588.045/0001-31

**SAC 0800 011 1919**

Responsável Técnica: Vanessa da Silva Lopes - CRMV SP nº 28.204

40040305