

Poulvac® Mix 6

Vacina inativada contra Newcastle, Bronquite Infeciosa, Síndrome da Queda de Postura e Coriza Infeciosa das aves.

USO VETERINÁRIO

zoetis

Conteúdo: 500 mL (1.000 doses)

Proprietário e Fabricante:

Zoetis Indústria de Produtos Veterinários Ltda.

Rua Luiz Fernando Rodriguez, 1701

CEP 13064-798 - Campinas - SP

CNPJ 43.588.045/0001-31

Indústria Brasileira

SAC 0800 011 1919

Advertências:

Após o uso, incinerar o recipiente e eventuais sobras do produto.

Não reutilizar a embalagem.

Vacinar somente aves saudáveis.

Não vacinar durante os 21 dias que antecedem o abate.

Cuidados:

A auto-inoculação (injeção acidental de vacina em humanos) pode provocar sérias reações teciduais.

Se isso acontecer, procure orientação médica imediatamente, levando consigo o frasco da vacina.

Validade do produto: 24 meses após a data de fabricação.

Manter este ou qualquer outro medicamento fora do alcance de crianças e animais domésticos.

Responsável Técnica: Vanessa da Silva Lopes - CRMV SP nº 28.204

Licenciado no Ministério da Agricultura sob o nº 6097, em 21/08/97.

PART.:

FABR.:

VENC.:



Composição:

Suspensão inativada de fluidos virais de Newcastle, Bronquite Infeciosa das aves, EDS e fluidos bacterianos de *Haemophilus paragallinarum*, emulsionada em adjuvante oleoso.

Indicações:

Prevenção da Doença de Newcastle, Bronquite Infeciosa das aves, Síndrome da Queda de Postura e Coriza Infeciosa.

Ler atentamente as instruções antes de usar.

Conservar à temperatura entre 2°C e 8°C. Não permitir o congelamento. Antes de usar, deixar que o produto atinja a temperatura ambiente (22°C). Agitar bem antes e durante o uso. Utilizar agulhas, seringas e equipamentos esterilizados. Desinfetar a tampa de borracha com algodão embebido em álcool antes de introduzir a agulha. Durante a vacinação, trocar a agulha a cada 500 aves. Uma vez aberto o frasco, usar todo o conteúdo.

Vias de Administração e Modo de Usar:

Administrar 0,5 mL/ave, por via intramuscular no peito ou coxa.

Recomendada para revacinação de aves entre 15 e 22 semanas de idade.