

zoetis

Poulvac® Reo

Vacina contra a Artrite Viral

Produzida em embriões de ovos SPF. Vírus vivo, cepa 1133.

USO VETERINÁRIO

Composição:

Cada dose do produto contém suspensão de Reovírus cepa #1133, vivo atenuado, com título mínimo na data da liberação de $10^{2,7}$ DIOE₅₀ e na data do vencimento de $10^{2,0}$ DIOE₅₀.

Indicação: Prevenção da Artrite Viral (Tenosinovite Infecciosa) em galinhas.

Esquema geral de vacinação: Vacinar galinhas destinadas à reprodução com uma ou duas doses de Poulvac® Reo a partir de 1 semana de idade. Recomenda-se a revacinação com vacinas oleosas aproximadamente 4 semanas antes da entrada na fase de produção de ovos.

O emprego de programas de vacinação integrados (combinando as vacinas vivas e inativadas) favorece a formação de altos níveis de anticorpos que serão transmitidos passivamente à prole. Os anticorpos maternos conferem proteção durante as primeiras semanas de vida das aves.

Programas de vacinação alternativos podem ser empregados, mediante orientação de Médico Veterinário especializado em Avicultura.

Vias de Administração e Modo de Usar:

Utilizar somente o diluente fornecido pelo fabricante desta vacina, visto que todas as provas de controle de qualidade foram realizadas com o diluente próprio. Mantenha um registro das vacinas e diluentes utilizados.

Usar 10 mL de diluente para cada 1.000 doses de vacina.

Preparar apenas um frasco de vacina por vez, conforme segue:

- Remover o lacre de alumínio e a tampa de borracha dos frascos de vacina e do diluente.
- Transferir 2 mL do diluente para o frasco de vacina.
- Recolocar a tampa de borracha e agitar suavemente até a completa dissolução.
- Transferir a vacina reconstituída para o frasco do diluente, e homogeneizar novamente até obter uma mistura uniforme.
- Usar imediatamente após o preparo.

Punção na membrana da asa: Conter a ave, posicionando horizontalmente uma das asas. Introduzir o estilete no frasco de vacina previamente reconstituída com o diluente específico, mantendo-o na posição vertical. Certificar-se que ambas as agulhas estejam umedecidas. Puncionar a membrana da asa, transfixando-a de cima para baixo, evitando atingir vasos sanguíneos, ossos, penas e músculos. A vacinação se completa quando as fendas das agulhas ultrapassam a face inferior da membrana da asa.

Informações complementares: A vacina é destinada a estimular a formação de imunidade ativa contra a Artrite Viral. Entretanto, a resposta à vacinação varia de ave para ave. A reação imunológica pode ser influenciada por fatores congênitos, infecções subclínicas, condições de manejo, uso concomitante de drogas, estresse, entre outros. O sucesso da vacinação também depende do correto transporte, estocagem e administração do produto.

Precauções: • Manter a vacina e os materiais usados no preparo e administração do produto fora do alcance de crianças e animais domésticos. • Não vacinar aves parasitadas ou com doenças intercorrentes. • Não vacinar durante os 21 dias que antecedem ao abate. • Não fracionar a dose recomendada. • Administrar a vacina dentro de no máximo 2 horas após a reconstituição. • Uma vez aberto o frasco, usar todo o conteúdo. • Após o uso, incinerar os frascos e eventuais sobras.

Apresentação: Caixas com 10 frascos de 500 ou 1.000 doses.

Acompanham a embalagem: 10 frascos de 5 mL ou 10 mL de diluente estéril, respectivamente, e estilete.

Validade do produto: 12 meses após a data de fabricação.

Conservar à temperatura entre 2°C e 8°C.

Licenciado no Ministério da Agricultura sob nº 9323 em 13/07/07.

Venda sob prescrição e aplicação sob orientação do Médico Veterinário.

Responsável Técnica: Vanessa da Silva Lopes - CRMV SP nº 28.204

zoetis

Proprietário e Fabricante:
Zoetis Indústria de Produtos Veterinários Ltda.

Rua Luiz Fernando Rodriguez, 1701

CEP 13064-798 - Campinas - SP

CNPJ 43.588.045/0001-31

Indústria Brasileira

SAC 0800 011 1919