

zoetis

Poulvac® TRT

Vacina viva contra a Rinotraqueíte Infecciosa dos perus e Pneumovirose das galinhas

USO VETERINÁRIO

Vacina liofilizada a vírus vivo modificado, amostra Clone K, produzida em cultivos de células de linhagem.

Composição:

Suspensão do vírus vivo da Rinotraqueíte Infecciosa dos perus, Clone K com:

Título mínimo na data da liberação 10^{2.3} DICT₅₀

Título mínimo na data do vencimento 10^{1.6} DICT₅₀

Veículo q.s.p 1 dose

Indicações:

Recomendada para a prevenção da Rinotraqueíte Infecciosa dos perus (TRT - "Turkey Rhinotracheitis") e das síndromes respiratórias das galinhas associadas ao Pneumovírus aviário (PVA).

Ler atentamente as instruções antes de usar.

Esquema Geral de Vacinação:

Poulvac TRT deve ser administrada a perus ou pintos de 1 dia de idade. Programas de vacinação alternativos podem ser utilizados mediante prescrição de Médico Veterinário.

Vias de Administração e Modo de Usar:

Administrar O1 (uma) dose de **Poulvac TRT** por ave, por spray ou através da via óculo-nasal, de acordo com o seguinte procedimento:

Administração por Spray:

Utilizar vacinadoras automáticas (gabinetes) ou aspersores manuais. Abrir o frasco de vacina e adicionar o diluente específico **Aerovac** até a metade do mesmo. Fechar e agitar até a dissolução total do produto. Transferir a vacina assim diluída para o frasco de diluente e a seguir enxaguar o frasco de vacina. Alternativamente pode ser usada água limpa, fresca e não clorada até a proporção máxima de 1/2 do volume necessário de solução vacinal. Transferir a solução vacinal para o recipiente acoplado à cabine de spray ou para o tanque do pulverizador (aspersores manuais). Pulverizar com gotículas de tamanho aproximado de 120-150µ ("Coarse Spray"). Aplicar o jato de spray diretamente sobre as aves, mantendo uma distância de aproximadamente 50 cm entre o bico do pulverizador e as aves.

Administração Ocular/Nasal:

Reconstituir a vacina utilizando o diluente específico **Pro-Ocular**.

Adaptar o bico dosador no frasco do diluente.

Conter a ave na posição lateral com o olho direito (preferencialmente) voltado para cima.

Depositar uma gota da solução vacinal sobre o olho aberto, mantendo o frasco sempre na posição vertical.

Aguardar alguns instantes até que a gota seja absorvida, evitando que a ave se movimente para não haver perda de vacina.

No caso de aplicação nasal, fechar uma narina com os dedos e aplicar uma gota de vacina sobre a outra.

Aguardar até que a gota seja completamente inalada antes de soltar a ave.

Precauções:

Não vacinar aves doentes ou sob condições estressantes.

Utilizar somente o diluente específico para reconstituição da vacina. O uso de água ou outro diluente contendo resíduos de desinfetantes, detergentes, cloro, ferro ou nitratos pode tornar a vacina ineficiente.

Não fracionar a dose recomendada.

Recomendações:

Conservar esta vacina entre 2°C e 8°C até o momento de usar.

Não congelar. Não expor a vacina ao calor ou à luz direta do sol.

Manter a vacina refrigerada durante a vacinação.

Uma vez aberto o frasco, usar todo o conteúdo.

Queimar os frascos e eventuais sobras.

Validade do produto: 20 meses após a data de fabricação.

Apresentação: **Poulvac TRT** apresenta-se liofilizada, em frascos de vidro neutro contendo 500, 1.000, 2.000 ou 5.000 doses, acondicionados em caixas contendo 10 frascos cada.

Licenciado no Ministério da Agricultura sob nº 8450 em 23/01/03.

zoetis

Proprietário e Fabricante:

Zoetis Indústria de Produtos Veterinários Ltda.

Rua Luiz Fernando Rodriguez, 1701

CEP 13064-798 - Campinas - SP

CNPJ 43.588.045/0001-31 - Indústria Brasileira

Responsável Técnica: Vanessa da Silva Lopes

CRMV SP nº 28.204

SAC 0800 011 1919