zoetis

Poxine®-AE

Vacina viva, liofilizada contra a Bouba Aviária e Encefalomielite Aviária

Produzida em ovos SPF

USO VETERINÁRIO

Ler atentamente as instruções antes de usar.
Conservar sob refrigeração entre 2ºC e 8ºC, até o momento de usar.
O uso deste produto deverá ser suspenso 30 dias antes do abate.
Recomenda-se para prevenção da Bouba Aviária e Encefalomielite Aviária em galinhas reprodutoras e frangas de postura.
Vacinar entre 10 e 12 semanas de idade.

Galinhas de reposição anteriormente vacinadas com Chick-N-Pox devem ser revacinadas com a Poxine-AE.

Preparação da vacina:
Preparar um frasco de vacina por vez, pois a mesma torna-se perecível quando reconstituída.
1. Remover o lacre de alumínio e a tampa de borracha de ambos os frascos (vacina e diluente).
2. Transferir o diluente para o frasco de vacina.
3. Colocar a tampa de borracha e agitar até a completa dissolução.
4. Usar imediatamente.

Queimar o frasco e todo o conteúdo não utilizado.

Punção na membrana da asa:
1. Conter a ave e levantar uma das asas para cima.
2. Introduzir o estilete no frasco de vacina.
3. Certificar-se que ambas as agulhas estejam umedecidas.
4. Puncionar a membrana da asa de dentro para fora.

A vacinação se completa quando as fendas das agulhas ultrapassam a membrana da asa.
Entretanto, evitar atingir vasos sanguíneos, ossos, penas e músculos.

Recomendações:
Vacinar à sombra e em temperatura moderada.
Não expor a vacina ao calor excessivo e aos raios diretos do sol.
Vacinar somente aves sadias.

Reação da vacina:
A "pega" consiste na inflamação no ponto de aplicação.
Normalmente aumenta nos 5 dias subsequentes à vacinação (pápula/ pústula) e termina com a formação de uma crosta.
Revacinar as galinhas que não mostrarem tais reações.

Imunidade:
As galinhas imunizadas transmitem, através do ovo, os anticorpos para proteger a progênie contra a Encefalomielite, assim como a queda da produção. O grau de imunidade varia de ave para ave. Entretanto, a imunidade contra a Bouba é apreciável 10 dias após a vacinação.

Precaução:
Este produto deve ser armazenado, transportado e administrado conforme instruções.

Esta vacina contém penicilina e estreptomicina como agentes bacteriostáticos.

Apresentação:
Caixas contendo 10 frascos de 100, 500, 1.000 e 2.000 doses, acompanhados com diluente.

Validade do produto: 24 meses após a data de fabricação.

Licenciado no Ministério da Agricultura sob o nº 3.226, em 31/05/89.

zoetis

Proprietário e Fabricante:
Zoetis Indústria de Produtos Veterinários Ltda.
Rua Luiz Fernando Rodriguez, 1701
CEP 13064-798 - Campinas - SP
CNPJ 43.588.045/0001-31 - Indústria Brasileira
Responsável Técnica: Vanessa da Silva Lopes
CRMV SP nº 28.204
SAC 0800 011 1919

40039903 / GQ-047