

Linco-Spectin[®] 100

USO VETERINÁRIO

ATENÇÃO - OBEDECER AOS SEGUINTE PERÍODOS DE CARÊNCIA:

SUÍNOS: ABATE: 2 DIAS.

AVES: ABATE: 2 DIAS. OVOS: ESTE PRODUTO NÃO DEVE SER APLICADO EM AVES PRODUTORAS DE OVOS PARA O CONSUMO HUMANO.

PERUS: ABATE: 3 DIAS.

A UTILIZAÇÃO DO PRODUTO EM CONDIÇÕES DIFERENTES DAS INDICADAS NESTA BULHA PODE CAUSAR A PRESENÇA DE RESÍDUOS ACIMA DOS LIMITES APROVADOS, TORNANDO O ALIMENTO DE ORIGEM ANIMAL IMPRÓPRIO PARA O CONSUMO.

FÓRMULA:

Cada 100 g do produto contém:

Espectinomina (na forma de Sulfato de Espectinomina)	44,50 g
Lincomicina (na forma de Cloridrato de Lincomicina)	22,20 g
Excipiente q.s.p.	100,00 g

INDICAÇÕES:

Frangos de corte e Reprodutoras: Linco-Spectin[®] 100 é indicado no tratamento de infecções intestinais em frangos de corte e reprodutoras, causadas por *Escherichia coli*, *Salmonella* Enteritidis, *Clostridium perfringens* e *Campylobacter jejuni*.

Perus: Linco-Spectin[®] 100 é indicado no tratamento de infecções intestinais em perus, causadas por *Escherichia coli*, *Salmonella* Enteritidis, *Clostridium perfringens* e *Campylobacter jejuni*.

Suínos: Linco-Spectin 100[®] é indicado no tratamento de infecções intestinais em suínos, causadas por *Clostridium perfringens*, *Escherichia coli* e *Salmonella* Typhimurium, e no tratamento de infecção pulmonar causada por *Streptococcus suis*. Linco-Spectin[®] 100 também é indicado no tratamento de infecções causadas por *Brachyspira hyodysenteriae* (disenteria suína) e *Lawsonia intracellularis* (ileíte) em suínos.

ADMINISTRAÇÃO E DOSAGEM:

Linco-Spectin[®] 100 deve ser administrado por via oral, na água de bebida. Oferecer como única fonte de bebida até o consumo completo. Preparar uma solução limpa e fresca a cada dia.

Frangos de corte e Reprodutoras: Utilizar a dose de 25 a 50 mg de atividade antibiótica (Lincomicina e Espectinomina) por kg de peso vivo, por via oral (água de bebida), durante 3 a 7 dias consecutivos, para o tratamento de infecções intestinais em frangos de corte e reprodutoras causadas por *Escherichia coli*, *Salmonella* Enteritidis, *Clostridium perfringens* e *Campylobacter jejuni*.

Perus: Utilizar a dose de 50 mg de atividade antibiótica (Lincomicina e Espectinomina) / kg de peso vivo, por via oral (água de bebida), durante 3 dias consecutivos, para tratamento de infecções intestinais em perus causadas por *Escherichia coli*, *Salmonella* Enteritidis, *Clostridium perfringens* e *Campylobacter jejuni*.

Suínos: Utilizar a dose de 10 mg de atividade antibiótica / kg de peso vivo, por via oral (água de bebida), durante 4 dias consecutivos, no tratamento de infecções intestinais em suínos causadas por *Clostridium perfringens*, *Escherichia coli* e *Salmonella* Typhimurium e, no tratamento de infecção pulmonar causada por *Streptococcus suis*.

Utilizar a dose de 10 mg de atividade antibiótica / kg de peso vivo, por via oral (água de bebida), durante 7 dias consecutivos, no tratamento de infecções causadas por *Brachyspira hyodysenteriae* (disenteria suína) e *Lawsonia intracellularis* (ileíte) em suínos.

PRECAUÇÕES: Manter fora do alcance de crianças e de animais domésticos.

CONTRA-INDICAÇÕES:

Coelhos, “Porquinho-da-Guiné”, hamsters, equinos e ruminantes não devem ter acesso a alimento que contenha Lincomicina. A ingestão por essas espécies pode resultar em efeitos gastrintestinais severos.

EFEITOS COLATERAIS:

Ocasionalmente, os suínos tratados com lincomicina podem apresentar diarreia e/ou edema do ânus nos primeiros 2 dias de tratamento. Em raras ocasiões, alguns animais podem apresentar vermelhidão na pele e comportamento irritado. Estas alterações podem ser autocorrigidas dentro de 5 a 8 dias, sem necessidade de interrupção do tratamento.

ARMAZENAMENTO:

Conservar o produto em sua embalagem original, em temperatura ambiente (entre 15°C e 30°C), mantido em local seco e fresco e ao abrigo da luz solar.

APRESENTAÇÃO: Frascos plásticos contendo 150 g.

EXEMPLOS PARA PREPARAR:

Frangos de corte e Reprodutoras: (50 mg/kg atividade antibiótica)

Idade	Quantidade LS 100	Nº Aves Tratadas	Litros de Água
1ª semana	1 pote	13.000	120 litros
4ª semana	1 pote	1.800	300 litros

Suínos (10 mg/kg de atividade antibiótica)

Quantidade LS 100	Litros de Água
1 pote	1.500 litros

RESTRIÇÕES DE USO:

Não administrar em aves de postura comercial.

Venda sob prescrição e aplicação sob orientação do Médico Veterinário. Licenciado no Ministério da Agricultura sob nº 7.652 em 22/02/2001.

Proprietário:

Zoetis Indústria de Produtos Veterinários Ltda.
Rua Luiz Fernando Rodriguez, 1701
CEP 13064-798 - Campinas - SP
CNPJ nº 43.588.045/0001-31
Responsável Técnica: Vanessa da Silva Lopes
CRMV SP nº 28.204
SAC 0800 011 1919 - Indústria Brasileira

zoetis

zoetis

Conteúdo: 150 g