

# Linco-Spectin<sup>®</sup> 440

## USO VETERINÁRIO

### ATENÇÃO: OBEDECER AOS SEGUINTE PERÍODOS DE CARÊNCIA

#### SUÍNOS:

ABATE: O PRODUTO NÃO REQUER PERÍODO DE CARÊNCIA PARA O ABATE DE SUÍNOS TRATADOS.

#### AVES:

ABATE: O PRODUTO NÃO REQUER PERÍODO DE CARÊNCIA PARA O ABATE DE AVES TRATADAS.

OVOS: ESTE PRODUTO NÃO DEVE SER APLICADO EM AVES PRODUTORAS DE OVOS PARA O CONSUMO HUMANO.

**A UTILIZAÇÃO DO PRODUTO EM CONDIÇÕES DIFERENTES DAS INDICADAS NESTA BULA PODE CAUSAR A PRESENÇA DE RESÍDUOS ACIMA DOS LIMITES APROVADOS, TORNANDO O ALIMENTO DE ORIGEM ANIMAL IMPRÓPRIO PARA O CONSUMO.**



### FÓRMULA

Cada 100 g contém:

Lincomicina (como Cloridrato de Lincomicina) .....	22 g
Espectinomicina (como Sulfato Tetraidratado de Espectinomicina) .....	22 g
Excipiente q.s.p. ....	100 g

### IMPORTANTE

Misturar completamente à ração antes do uso. A embalagem aberta deve ser mantida em temperatura ambiente (15°C a 30°C) e protegido da luz solar. Manter fora do alcance de crianças e animais domésticos.

### INDICAÇÕES

#### Suínos

Controle e tratamento de enterites associadas com *Brachyspira hyodysenteriae*, *Brachyspira pilosicoli*, *Lawsonia intracellullaris*, *Escherichia coli* e *Salmonella* spp.

Como auxiliar no controle de pneumonia micoplásmica (*Mycoplasma hyopneumoniae*) e pneumonia bacteriana (*Pasteurella multocida*, *Streptococcus* spp).

#### Avés

Controle da mortalidade precoce associada a *Escherichia coli*.

### CONTRAINDICAÇÕES

Coelhos, "Porquinho-da-Guiné", hamsters, equinos e ruminantes não devem ter acesso a alimento que contenha Lincomicina. A ingestão por essas espécies pode resultar em efeitos gastrintestinais severos.

### EFEITOS COLATERAIS

Ocasionalmente, os suínos tratados com Lincomicina podem apresentar diarreia e/ou edema do ânus nos primeiros 2 dias de tratamento. Em raras ocasiões, alguns animais podem apresentar vermelhidão na pele e comportamento irritadiço. Estas alterações podem ser autocorrigidas dentro de 5 a 8 dias, sem necessidade de interrupção do tratamento.

### DOSAGENS E MODO DE USAR

#### Suínos

##### Tratamento de disenteria suína

Administrar 88 g de atividade antibiótica (44 g de Lincomicina + 44 g de Espectinomicina) por 1.000 kg de alimento completo e oferecer como única ração, durante 3 semanas.

##### Controle de disenteria suína

Administrar 44 g de atividade antibiótica (22 g de Lincomicina + 22 g de Espectinomicina) por 1.000 kg de alimento completo e oferecer como única ração.

##### Controle de pneumonia micoplásmica

Administrar 44 a 110 g de atividade antibiótica por 1.000 kg de alimento completo e oferecer como única ração, durante 3 semanas.

##### Prevenção e controle de ileíte

Administrar 44 a 88 g de atividade antibiótica por 1.000 kg de alimento completo e oferecer como única ração, durante 3 semanas.

#### Avés

##### Controle da mortalidade precoce

Administrar 88 g de atividade antibiótica por 1.000 kg de ração e oferecer como único alimento, durante 3 semanas.

### EXEMPLOS PARA PREPARAR

Para preparar suplementos medicados que contenham as seguintes quantidades de atividade antibiótica:	Misturar as seguintes quantidades de Linco-Spectin 440 para preparar 1 tonelada (1.000 kg) de suplemento medicado:
11 g/t	25 g
22 g/t	50 g
44 g/t	100 g
88 g/t	200 g
110 g/t	250 g
132 g/t	300 g

### RESTRIÇÃO DE USO

Não administrar em aves de postura.

### APRESENTAÇÃO

Barrica com saco plástico contendo 25 kg do produto.

Venda sob prescrição e aplicação sob orientação do Médico Veterinário.

Licenciado no Ministério da Agricultura sob o nº 7.653 em 22/02/01.

**Proprietário:** Zoetis Indústria de Produtos Veterinários Ltda.

R. Luiz Fernando Rodriguez, 1701 - Campinas - SP  
CEP 13064-798 - CNPJ nº 43.588.045/0001-31

Responsável Técnica: Vanessa da Silva Lopes - CRMV SP nº 28.204  
SAC 0800 011 1919 - Indústria Brasileira

**Fabricante:** Ourofino Saúde Animal Ltda.

Rodovia Anhanguera, SP 330, km 298

Distrito Industrial - Cravinhos - SP

CEP 14140-000 - CNPJ nº 57.624.462/0001-05

