

A-D-E INJETÁVEL

Emulsificável

USO VETERINÁRIO

ATENÇÃO: OBEDECER AOS SEGUINTE PERÍODOS DE CARÊNCIA

BOVINOS E EQUINOS: ABATE: O PRODUTO NÃO REQUER PERÍODO DE CARÊNCIA PARA O ABATE DE BOVINOS E EQUINOS TRATADOS. **CAPRINOS E SUÍNOS:** ABATE: O PRODUTO NÃO REQUER PERÍODO DE CARÊNCIA PARA O ABATE DE CAPRINOS E SUÍNOS TRATADOS. **COELHOS:** ABATE: O PRODUTO NÃO REQUER PERÍODO DE CARÊNCIA PARA O ABATE DE COELHOS TRATADOS.

A UTILIZAÇÃO DO PRODUTO EM CONDIÇÕES DIFERENTES DAS INDICADAS NESTA BULA PODE CAUSAR A PRESENÇA DE RESÍDUOS ACIMA DOS LIMITES APROVADOS, TORNANDO O ALIMENTO DE ORIGEM ANIMAL IMPRÓPRIO PARA O CONSUMO.

FÓRMULA:

Cada 100 mL contém:

| | |
|-------------------------------|---------------|
| Vitamina A | 25.000.000 UI |
| Vitamina D ₃ | 7.000.000 UI |
| Vitamina E | 7.000 UI |
| Veículo q.s.p. | 100 mL |

Descrição:

A-D-E Injetável Emulsificável é um produto estéril e pronto para uso. Contém as Vitaminas A, D₃ e E em quantidades equilibradas, capazes de atender as exigências orgânicas dos animais, constituindo, pois, eficaz tratamento quer curativo, quer profilático, nas hipovitaminoses A, D e E. O produto com ação emulsificante contribui para melhorar, acelerar e potencializar a absorção das vitaminas A, D e E proporcionando um considerável aumento nas suas reservas hepáticas e disponibilidade orgânica.

Indicações

A-D-E Injetável Emulsificável é indicado como fonte de vitaminas A, D e E para bovinos, equinos, suínos, caprinos e coelhos. Recomenda-se o uso do produto nos seguintes casos:

- Prevenir doenças carenciais de vitaminas A-D-E.
- Suprir as reservas vitamínicas em fases difíceis do ano.
- Aumentar a resistência às infecções.
- Auxiliar no tratamento de doenças infecciosas.

Modo de uso e dosagens:

A-D-E Injetável Emulsificável é indicado por via intramuscular ou subcutânea, nas seguintes doses:

Bovinos e equinos:

Animais jovens: 1 mL para cada 50 Kg de peso, cada 45 dias.

Recria e engorda: 5 mL/cabeça, cada 120 dias.

Animais em confinamento, reprodução, gestação ou lactação: 5 mL/cabeça, cada 75 dias.

Suínos:

Leitões até 3 meses: 0,5 mL/cabeça.

Recria: 1 mL/cabeça, cada 75 dias.

Porcas em gestação e reprodutores: 3 mL/cabeça, cada 75 dias.

Ovinos e caprinos:

Animais jovens: 0,5 mL/cabeça. Reprodutores: 2 mL/cabeça, cada 75 dias.

Coelhos:

Reprodução: 0,5 mL/cabeça, cada 75 dias.

ATENÇÃO: Não se recomenda o uso em cães e gatos.

Precaução: Deve-se observar que em determinadas regiões, podem ocorrer casos raros de animais que em seguida à aplicação de medicamentos injetáveis contendo vitaminas, podem apresentar reações de hipersensibilidade individuais (hipersalivação, incoordenação dos movimentos, edema das mucosas ocular e vaginal), que podem desaparecer espontaneamente em alguns minutos. Quando se trata de animais hipersensíveis, recomendamos aplicar, via intramuscular ou endovenosa, produtos anti-histamínicos (Prometazina 100 a 150 mg, ou Fenegan, 2 a 3 ampolas de 2 mL), e ainda corticosteroides, nas dosagens recomendadas pelo fabricante.

CUIDADOS: Limpar e desinfetar a seringa, a agulha e o local da aplicação.

Conservar em ambiente seco e fresco, uma vez em uso, guardar o frasco em refrigeração.

Agitar antes de usar.

MANTENHA FORA DO ALCANCE DE CRIANÇAS E DE ANIMAIS DOMÉSTICOS.

VENDA E APLICAÇÃO SOB ORIENTAÇÃO DO MÉDICO VETERINÁRIO.