

# Barrage®

## Carrapaticida, mosquicida e inseticida piretróide.

### USO VETERINÁRIO

**Barrage®** é um concentrado emulsionável contendo 150 gramas de alfaciano-3-fenoxibenzil-2,2-dimetil-3-(2,2-diclorovinil)-ciclopropano carboxilato (Cipermetrina) por litro. **Barrage®** é facilmente emulsionável em água.

Deve ser usado em banheiros de imersão ou em pulverização, podendo ser aplicado em pulverizadores manuais ou motorizados. É ativo contra todos os tipos de carrapatos em suas formas jovens ou adultas, inclusive às linhagens resistentes à carrapaticidas de outros grupos químicos. Baixa toxicidade.

**Barrage®** é muito eficaz contra a "mosca-do-chifre" (*Haematobia irritans*). Apresenta boa estabilidade e permanece ativo por longo período de tempo. Poder residual de 8 a 14 dias.

#### Instruções de Uso:

##### Em banheiro de imersão:

**Carga:** Utilizar 1 litro de **Barrage®** para 1000 litros de água (1 : 1000).

**Recarga:** Utilizar 1,5 litros de **Barrage®** para 1000 litros de água (1,5 : 1000).

Casos de infestações severas por carrapatos, usar 1 litro de **Barrage®** para cada 600 litros de água (1:600).

Para o preparo da calda do banho de imersão, é importante fazer uma pré-mistura em um balde adicionando a quantidade necessária de **Barrage®** ao dobro deste volume em água, agitando até a formação de uma emulsão homogênea. Despeja-se então esta mistura no banheiro e completa-se o volume, agitando-se vigorosamente a calda para uma perfeita homogeneização. Sempre que o banheiro ficar um tempo sem uso, agitar novamente.

**Em pulverização:** Diluir 20 mL de **Barrage®** em 20 litros de água a serem utilizados, misturando bem. Banhar toda a superfície do animal, especialmente as regiões mais sujeitas às infestações por moscas ou carrapatos, tais como: orelhas, barbela, entre membros, virilhas e inserção da cauda. Usar sempre pulverizadores com boa pressão e dirigir o jato no sentido contrário aos pêlos. Recomenda-se o consumo de 5 litros de produto diluído no banho de cada bovino adulto.

**Intervalos entre os banhos:** Os tratamentos podem ser repetidos a cada 4 ou 5 semanas.

**Precauções no Manuseio:**

- Evitar a contaminação de alimentos e material de ordenha.
- Evitar contato com a pele do operador, especialmente antes de diluir o produto.
- Evitar fumar quando estiver pulverizando ou junto ao banheiro.
- Não usar a embalagem vazia.
- Não guardar ou aplicar junto de alimentos, bebidas, medicamentos, produtos de higiene e domésticos.
- Evitar pulverização contra o operador.
- Lavar as mãos e a pele exposta antes de comer, beber ou fumar e após o trabalho.
- Produto tóxico para peixes.
- Não contaminar cursos d'água.
- Não jogar resíduos de banheiros carrapaticidas em rios e lagos.
- Procurar queimar ou enterrar as embalagens vazias.

**Barrage®** deve ser mantido em sua embalagem original, em temperatura ambiente (15°C a 30°C) e protegido da luz solar. Manter fora do alcance de crianças e animais domésticos.

**Primeiros Socorros (Tratamento de Contaminação Acidental):** Remover imediatamente as roupas contaminadas e lavar as partes atingidas do corpo com água e sabão. Se o produto atingir os olhos, lavar-se imediatamente com água durante 15 minutos e chamar o médico.

#### Antídoto (Informação para Médicos):

Não há antídoto específico. Tratar sintomaticamente.

TELEFONE DE EMERGÊNCIA PARA USO MÉDICO: 0800 014 8110

 **CUIDADO VENENO**