

# BMD® GRANULADO 11%

## USO VETERINÁRIO

### Bacitracina Metileno Disalicilato

PARA SUPLEMENTAÇÃO DE RAÇÕES DE SUÍNOS, FRANGOS, PERÚS, FAISÕES E CODORNAS, NA PREVENÇÃO E CONTROLE DE INFECÇÕES PROVOCADAS PELO *Clostridium* spp. E OUTROS MICROORGANISMOS SENSÍVEIS À BACITRACINA METILENO DISALICILATO.

FÓRMULA: Cada 100 gramas contém BACITRACINA METILENO DISALICILATO.....11 g  
EXCIPIENTE q.s.p. ....100 g

#### INDICAÇÕES:

##### FRANGOS DE CORTE, POEDEIRAS E AVES DE REPOSIÇÃO

- Prevenção e controle da enterite necrótica provocada ou complicada pelo *Clostridium* spp.

##### PERÚS

- Controle da enterite transmissível na fase de crescimento.

##### CODORNAS

- Prevenção e controle da enterite ulcerativa causada pelo *Clostridium colinum*.

##### SUÍNOS

- Prevenção e controle da disenteria suína associada ao *Treponema hyodysenteriae*.

- Prevenção e controle da disenteria provocada ou complicada pelo *Clostridium* spp.

##### PARA TODAS AS ESPÉCIES

- Prevenção e controle das infecções intestinais generalizadas provocadas por microorganismos sensíveis à Bacitracina Metileno Disalicilato.

#### MODO DE USAR E DOSAGENS:

BMD® GRANULADO 11% é indicado para administração por via oral, através de rações, concentrados protéicos e premixes. O produto é adicionado diretamente nas formulações, nas concentrações indicadas para cada finalidade de tal forma que o consumo do alimento em cada fase do ciclo de vida, contemple a dosagem terapêutica indicada.

ESPÉCIES	INDICAÇÕES	ppm	g/tonelada de alimento
FRANGOS DE CORTE, POEDEIRAS E AVES DE REPOSIÇÃO	Prevenção da enterite necrótica provocada ou complicada pelo <i>Clostridium</i> spp. e outros microorganismos sensíveis à Bacitracina Metileno Disalicilato.	55	500
	Controle da enterite necrótica provocada ou complicada pelo <i>Clostridium</i> spp. e outros microorganismos sensíveis à Bacitracina Metileno Disalicilato.	110-220	1000-2000
PERÚS	Controle da enterite transmissível em perús na fase de crescimento, complicada por microorganismos sensíveis à Bacitracina Metileno Disalicilato.	220	2000
CODORNAS	Prevenção e controle da enterite ulcerativa causada pelo <i>Clostridium colinum</i> , complicada por microorganismos sensíveis à Bacitracina Metileno Disalicilato.	220	2000
SUÍNOS	Prevenção e controle da disenteria suína associada ao <i>Treponema hyodysenteriae</i> . Prevenção e controle da disenteria provocada ou complicada pelo <i>Clostridium</i> spp. e outros microorganismos sensíveis à Bacitracina Metileno Disalicilato. Porcas: 14 dias antes da data prevista para o parto e 21 dias pós-parto. Demais animais (até 56kg) administrar até o desaparecimento dos sintomas clínicos.	275	2500

As dosagens poderão ser modificadas a critério do Médico Veterinário.

#### CONDIÇÕES DE ARMAZENAMENTO:

Deve ser mantido em sua embalagem original, em temperatura ambiente (15°C a 30°C) e protegido da luz solar. Manter fora do alcance de crianças.

#### ATENÇÃO: OBEDECER AOS SEGUINTE PERÍODOS DE CARÊNCIA

##### AVES

ABATE: O PRODUTO NÃO REQUER PERÍODO DE CARÊNCIA PARA O ABATE DE AVES TRATADAS

##### SUÍNOS

ABATE: O PRODUTO NÃO REQUER PERÍODO DE CARÊNCIA PARA O ABATE DE SUÍNOS TRATADOS  
A UTILIZAÇÃO DO PRODUTO EM CONDIÇÕES DIFERENTES DAS INDICADAS NESTE RÓTULO-BULA PODE CAUSAR A PRESENÇA DE RESÍDUOS ACIMA DOS LIMITES APROVADOS, TORNANDO O ALIMENTO DE ORIGEM ANIMAL IMPRÓPRIO PARA O CONSUMO HUMANO

## PRODUTO IMPORTADO