

# Dopram® - V

## Cloridrato de Doxapram

### USO VETERINÁRIO

#### Injetável

#### Fórmula:

Cada 100 mL contém:

Cloridrato de Doxapram ..... 2,00 g

Veículo q.s.p. .... 100,00 mL

#### Indicações:

Em cães, gatos e equinos:

Para estimular a respiração durante a anestesia geral;

Para acelerar o despertar e a recuperação dos reflexos após a anestesia.

#### Em cães e gatos recém-nascidos:

Para iniciar ou estimular a respiração dos filhotes logo após cesariana ou parto distócico.

#### ATENÇÃO: OBEDECER AOS SEGUINTE PERÍODOS DE CARÊNCIA

#### EQUINOS:

**ABATE: ESTE PRODUTO NÃO DEVE SER APLICADO EM EQUINOS DESTINADOS AO ABATE PARA O CONSUMO HUMANO.**

**A UTILIZAÇÃO DO PRODUTO EM CONDIÇÕES DIFERENTES DAS INDICADAS NESTA BULA PODE CAUSAR A PRESENÇA DE RESÍDUO ACIMA DOS LIMITES APROVADOS, TORNANDO O ALIMENTO DE ORIGEM ANIMAL IMPRÓPRIO PARA O CONSUMO.**

#### Posologia e modo de usar:

##### Para cães recém-nascidos:

Administrar por via subcutânea, sublingual (tópica) ou intravenosa através da veia umbilical, em doses de 1 a 5 gotas (1 a 5 mg), dependendo do peso do recém-nascido e do grau do comprometimento respiratório.

##### Técnica de aplicação através da veia umbilical:

Quando o recém-nascido é apresentado através da incisão do útero, a membrana placentária e o líquido são removidos da boca e das narinas. Uma pinça é colocada

no cordão umbilical aproximadamente a 2,5 a 5,0 cm do abdômen do recém-nascido. A veia umbilical é isolada e a dose aplicada diretamente dentro da veia.

##### Para gatos recém-nascidos:

Administrar por via subcutânea ou sublingual (tópica) em dose de 1 a 2 gotas (1 a 2 mg) dependendo da crise respiratória.

Tabela de doses de **Dopram®-V** para cães e gatos, por via intravenosa:

	Anestesia por Barbitúricos	Anestesia por Inalantes
Peso do animal	0,275 mL (5,5 mg) a 0,55 mL (11 mg)/kg de peso	0,055 mL (1,1 mg) /kg de peso
4,5 kg	1,25mL (25mg) a 2,5 mL (50mg)	0,25mL (5 mg)
9,0 kg	2,5mL (50mg) a 5,0 mL (100mg)	0,5mL (10mg)
13,5 kg	3,75 mL (75 mg) a 7,5 mL (150 mg)	0,75 mL (15 mg)
23,0 kg	6,25mL (125mg) a 12,5 mL (250mg)	1,25mL (25mg)

Tabela de dosagem para equinos, por via intravenosa:

	Anestesia por Hidrato de cloral, Sulfato de magnésio, Barbitúricos:	Anestesia por inalantes, Halotano, Metoxifurano:
Peso do animal	0,25 mL (0,55 mg)/kg de peso	0,022 mL (0,44 mg)/kg de peso
45 kg	1,25 mL (25 mg)	1 mL (20 mg)
90 kg	2,5 mL (50 mg)	2 mL (40 mg)
225 kg	6,25 mL (125 mg)	5 mL (100 mg)
450 kg	12,5 mL (250 mg)	10 mL (200 mg)

A ação do **Dopram®-V** é rápida, iniciando-se, usualmente, em alguns segundos.

A duração e a intensidade do efeito

dependem da dose, da condição do animal na ocasião da administração do produto e do grau de anestesia. As doses deverão ser ajustadas de acordo com o grau de anestesia e com a situação do animal quanto à função respiratória.

A aplicação não deverá ser repetida até que os efeitos da primeira dose tenham cessado e a condição do paciente requeira outra aplicação.

A dosagem pode ser repetida em 15 a 20 minutos, se necessário.

#### Precauções e contra-indicações:

Não misturar **Dopram®-V** com soluções alcalinas. **Dopram®-V** não é antagonista de drogas relaxantes musculares e nem antagonista específico de narcóticos.

As doses devem ser ajustadas a critério do Médico Veterinário, para atender às necessidades da situação.

É essencial que as vias respiratórias estejam desobstruídas.

A pressão sanguínea e os reflexos deverão ser verificados periodicamente durante o tratamento.

É contra-indicado aos animais com edema cerebral. Administrar sob estrita vigilância em animais com cardiopatias, enfermidades convulsionantes ou hipertensão grave.

#### Efeitos colaterais:

Doses excessivas podem produzir hiperventilação, que podem levar à alcalose respiratória e, embora raramente, poderão ser observadas náuseas, tosse, agitação e taquicardia.

#### Advertências especiais

I- Em cachorros sedados com morfina, o **Doxapram** deve ser administrado com extrema precaução, visto que a dose de 10mg/kg pode produzir convulsões;

II- Em animais anestesiados com halotano, ciclopentano ou enflurano, a administração de **Doxapram** pode provocar arritmias.

#### Precauções especiais

I- Usar unicamente as vias de administração prescritas para cada espécie:

- Intravenosa em cavalos, cães e gatos adultos;

- Subcutânea, sublingual ou via veia umbilical em cães;

- Subcutânea ou sublingual em filhotes de gatos;

II- Não administrar uma segunda dose de **Doxapram** até que os efeitos da primeira dose tenham desaparecido;

III- Não há informações a respeito dos efeitos deste produto na gestação bem como não há dados sobre excreção do produto no leite.

#### Reações Adversas:

O **Doxapram** produz um incremento ininterrupto da frequência cardíaca durante o primeiro minuto após a administração, assim como alterações de magnitude e polaridade da onda T visível no ECG. Ambos os efeitos são transitórios e não são potencializados com a segunda administração do produto.

#### VENDA SOB PRESCRIÇÃO OBRIGATORIA E APLICAÇÃO SOB ORIENTAÇÃO DO MÉDICO VETERINÁRIO.

Deve ser mantido em sua embalagem original, em temperatura ambiente (15°C a 30°C) e protegido da luz solar.

Manter fora do alcance de crianças e animais domésticos.

#### PRODUTO IMPORTADO