

GiardiaVax®

Vacina inativada contra Giardiase Canina USO VETERINÁRIO

Indicações:

Para vacinação de cães saudáveis a partir de 8 semanas de idade, como auxiliar na prevenção da doença clínica causada por *Giardia lamblia*.

A Giardiase é uma doença grave causada por um protozoário flagelado, *Giardia lamblia*, atualmente disseminada por todo o mundo e reconhecida como zoonose pela Organização Mundial de Saúde (O.M.S.).

O cão infecta-se facilmente ingerindo cistos de *Giardia*, que podem estar presentes na água, nos alimentos ou nos pêlos dos animais.

A Giardiase causa a síndrome da má-absorção/má-digestão, levando à desidratação, diarreia, perda de peso, dor abdominal e flatulência. Além disso, são sinais clínicos comuns da Giardiase a perda de apetite, vômitos e letargia.

A vacinação de cães com **GiardiaVax®** reduz significativamente a incidência, severidade e duração da eliminação de cistos e, conseqüentemente, a contaminação do ambiente.

Posologia e Modo de Usar:

Aplicar uma dose de 1 mL por via subcutânea, assepticamente. Uma segunda dose deve ser aplicada de duas a quatro semanas após a primeira vacinação. Recomenda-se a revacinação anual. AGITAR BEM ANTES DE USAR.

Precauções:

- O uso concomitante com substâncias anti-microbianas ou anti-inflamatórias poderá interferir no desenvolvimento e manutenção da resposta imune após a vacinação.
- Conservar entre 2°C e 8°C, ao abrigo da luz. EVITAR CONGELAMENTO. Usar todo o conteúdo do frasco após aberto. Embora raras reações alérgicas e anafiláticas podem ser observadas. Nestes casos administrar anti-histamínico e epinefrina respectivamente.
- Após a exposição natural à *Giardia lamblia*, alguns cães vacinados podem eliminar cistos. Portanto, devem se adotar medidas de higiene e práticas de sanidade adequadas.
- Apenas animais saudáveis devem ser vacinados. Caso o animal esteja incubando a doença no momento da vacinação, a eficácia da vacina pode ser prejudicada.
- A resposta adequada à vacinação é diretamente ligada à competência imunológica de cada animal.
- Mantenha fora do alcance de crianças. Incinerar o frasco e a sobra do produto não utilizado.
- Contém Timerosal e Gentamicina como agentes conservantes.
- A vacinação deverá ser precedida por um minucioso exame clínico, realizado por um Médico Veterinário.