

Lepto-Bac-6®

Bacterina contra a Leptospirose bovina, equina e suína

Suspensões inativadas de *L. pomona*, *L. grippotyphosa*,
L. canicola, *L. icterohaemorrhagiae*, *L. wolffi* e *L. hardjo*.

USO VETERINÁRIO

Conservar à temperatura entre 2°C e 8°C.

Ler atentamente as instruções antes de usar.

Instruções: Não permitir congelamento. Agitar o frasco antes de usar. Uma vez aberto o frasco, usar todo o conteúdo. No caso de choque anafilático, aplicar Epinefrina ou Sulfato de Atropina.

Via de Administração e Modo de Usar: Dosagem de 3 mL, qualquer que seja a idade do animal.

Bovinos: vacinar após o desmame, pela via IM ou SC. Fazer uma dose de reforço 4 a 6 semanas após a 1ª dose. Revacinação semestral.

Equinos: vacinar após o desmame pela IM. Fazer uma dose de reforço 4 a 6 semanas após a 1ª vacinação. Revacinação semestral.

Marrãs: vacinar entre 6 e 2 semanas antes da primeira cobertura. Revacinar 2 semanas após.

Porcas: vacinar entre 6 e 2 semanas antes de cada cobertura.

Leitões: vacinar após o desmame.

Cachaços: vacinar aos 6 meses de idade. Revacinação semestral.

Animais portadores de Leptospirose devem ser isolados e submetidos a uma antibioticoterapia.

Venda sob prescrição e aplicação sob orientação do Médico Veterinário.