

zoetis larvicida  
bernicida  
aerossol  
uso VETERINÁRIO

# Matabicheiras forte SV



ONU 1950  
AEROSSÓIS

NÃO CONTÉM CFC



CUIDADO VENENO

TELEFONE DE EMERGÊNCIA  
PARA USO MÉDICO  
0800 014 8110

ATENÇÃO: OBEDECER AOS SEGUINTE PERÍODOS DE CARÊNCIA

#### BOVINOS

ABATE: O ABATE DOS ANIMAIS TRATADOS COM ESTE PRODUTO SOMENTE DEVE SER REALIZADO 3 DIAS APÓS A ÚLTIMA APLICAÇÃO.

LEITE: O LEITE DOS ANIMAIS TRATADOS COM ESTE PRODUTO NÃO DEVE SER DESTINADO AO CONSUMO HUMANO ATÉ 1 DIA APÓS A ÚLTIMA APLICAÇÃO DESTE PRODUTO.

A UTILIZAÇÃO DO PRODUTO EM CONDIÇÕES DIFERENTES DAS INDICADAS NESTE RÓTULO-BULA PODE CAUSAR A PRESENÇA DE RESÍDUOS ACIMA DOS LIMITES APROVADOS, TORNANDO O ALIMENTO DE ORIGEM ANIMAL IMPRÓPRIO PARA O CONSUMO.

MATABICHEIRAS FORTE SV Aerossol é um larvicida, bernicida e antimicrobiano, formulado à base de Clorfenvinól e Diclorvól, dois produtos organofosforados e Violeta de Genciana. A coloração do produto conferida pela violeta é passageira e permite identificar as lesões e os animais tratados. A ação antimicrobiana da Violeta de Genciana previne a infecção secundária nas feridas frente aos principais microrganismos associados às infecções cutâneas: *Staphylococcus aureus*, *Streptococcus dysgalactiae*, *Streptococcus agalactiae*, *Streptococcus uberis*, *Escherichia coli* e *Candida albicans*.

**Indicações:** MATABICHEIRAS FORTE SV Aerossol é indicado para o uso em bovinos, no tratamento tópico de miíase causada por larvas de *Cochliomyia hominivorax* e berne causada por larvas de *Dermatobia hominis*.

O uso do produto MATABICHEIRAS FORTE SV Aerossol, quando administrado durante 5 dias em intervalos de 24 horas, não demonstrou qualquer alteração clínica ou laboratorial no animal.

**Modo de Usar:** A formulação deve ser administrada nos animais, por via tópica spray diretamente sobre as incisões/lesões, a uma distância média de 15 cm por 5 segundos. O tratamento é eficaz com uma única aplicação, podendo ser repetido a cada 24 horas, sob orientação do Médico Veterinário.

**Precauções:** O operador deve evitar o contato e a aspiração da névoa e aplicar sempre no sentido do vento. Não guardar ou aplicar junto de alimentos, bebidas, medicamentos e produtos de higiene. Não usar a embalagem vazia. A embalagem não deve ser furada e nem exposta ao fogo. Deve ser mantido em sua embalagem original, em temperatura ambiente (15°C a 30°C) e protegido da luz solar. Manter fora do alcance de crianças e animais domésticos. Após aberto, utilizar todo o conteúdo em até 12 meses. Recomenda-se cuidado no seu emprego.

Antídoto: Sulfato de Atropina.

**Fórmula:** Cada 100 g contém (% p/p):

Supona (Chlorfenvinphos) .....	0,52 g
Vapona (Dichlorvos) .....	0,83 g
Excipiente q.s.p. ....	100 g