(Acetato de Melengestrol)

USO VETERINÁRIO

Indicações:
Para utilização em programas de sincronização de cio em fêmeas bovinas.
Para indução de ciclicidade em fêmeas bovinas em anestro.

ATENÇÃO: OBEDECER AOS SEGUINTES PERÍODOS DE CARÊNCIA
BOVINOS: ABATE: O ABATE DOS ANIMAIS TRATADOS SOMENTE DEVE SER REALIZADO 48 HORAS APÓS A ÚLTIMA APLICAÇÃO.

A UTILIZAÇÃO DO PRODUTO EM CONDIÇÕES DIFERENTES DAS INDICADAS NESTA BULA PODE CAUSAR A PRESENÇA DE RESÍDUOS ACIMA DOS LIMITES APROVADOS, TORNANDO O ALIMENTO DE ORIGEM ANIMAL IMPRÓPRIO PARA O CONSUMO.

Fórmula:
Cada 100 g do produto contém:
Melengestrol (acetato)..... 22,0 mg
Excipiente q.s.p..... 100 g

Administração e Modo de Usar:
Administração oral, misturado à ração ou sal mineral.

Doses:
MGA deve ser administrado misturado à ração ou sal mineral de fêmeas bovinas na dose de 0,50 mg de Melengestrol (acetato) por animal por dia, o que corresponde a 2,28 g de MGA por animal por dia (ver Tabela abaixo). A mistura deverá ser feita, de acordo com o consumo, na quantidade adequada para permitir a ingestão de 0,50 mg de Melengestrol (acetato) por animal por dia, ou 2,28 g de MGA por animal por dia, por um período entre 7 e 14 dias.

Exemplos de mistura de MGA no Suplemento:

Quantidade de suplemento (ração ou sal) a ser administrada por animal por dia	Quantidade de MGA a ser adicionada por 1000 kg de suplemento (ração ou sal) a ser administrada
0,25 kg	9,10 kg
0,50 kg	4,55 kg
0,75 kg	3,03 kg
1,00 kg	2,28 kg

Conservar em temperatura ambiente, em local seco e fresco, ao abrigo da luz solar.
Mantenha fora do alcance de crianças e de animais domésticos.

VENDA SOB PRESCRIÇÃO DO MÉDICO VETERINÁRIO

PRODUTO IMPORTADO