

USO VETERINÁRIO

ATENÇÃO: OBEDECER AOS SEGUINTE PERÍODOS DE CARÊNCIA

BOVINOS: ABATE: O PRODUTO NÃO REQUER PERÍODO DE CARÊNCIA PARA BOVINOS TRATADOS. LEITE: O PRODUTO NÃO REQUER PERÍODO DE CARÊNCIA PARA CONSUMO DO LEITE DE ANIMAIS TRATADOS.

A UTILIZAÇÃO DO PRODUTO EM CONDIÇÕES DIFERENTES DAS INDICADAS NESTA BULA PODE CAUSAR A PRESENÇA DE RESÍDUOS ACIMA DOS LIMITES APROVADOS, TORNANDO O ALIMENTO DE ORIGEM ANIMAL IMPRÓPRIO PARA O CONSUMO.

Brinco inseticida para controle da mosca-dos-chifres.

Fórmula:

Cada brinco de 15 g contém:

Diazinon 6,75 g

Excipientes q.s.p. 15,00 g

Indicações:

Para uso em bovinos de corte ou de leite, no controle das infestações pela mosca-dos-chifres (*Haematobia irritans*). **Top Tag® 180**, quando aplicado corretamente, é eficaz na proteção dos bovinos contra infestações pela mosca-dos-chifres durante até 180 dias.

Posologia e modo de usar:

Uso exclusivo em bovinos. Fixar um brinco por animal, numa das orelhas, com o animal corretamente contido, usando um aplicador apropriado tipo alicate, devidamente desinfetado.

O tratamento deve ser feito durante os meses mais favoráveis à infestação pela mosca-dos-chifres, na porção mediana da orelha, na face externa da mesma, tomando cuidado especial para o pino não atingir cartilagem ou vasos sanguíneos. A forma de brinco proporciona uma liberação gradual do diazinon da matriz de poliuretano o qual transmigra paulatinamente através da gordura cutânea, distribuindo-se por toda a pelagem, onde forma uma camada fatal para as moscas que venham a pousar sobre o bovino.

Para aplicação do **Top Tag® 180**, obedecer os seguintes passos:




FIGURA 1

Desinfetar o alicate aplicador antes do uso. Com o dedo polegar, pressionar a alavanca de pressão do alicate aplicador e introduzir o brinco. O "colarinho" do brinco deve ser colocado voltado para baixo.



FIGURA 2

Introduzir o pino do brinco na ponteira do alicate aplicador. Alinhar a ponta do macho com o furo da fêmea do brinco. O brinco e o contrapino estão prontos para aplicação.



FIGURA 3

Posicionar o brinco na superfície plana e no centro da face posterior da orelha. Evitar que o contrapino atinja cartilagem ou vasos sanguíneos para evitar danos à orelha.



FIGURA 4

Posição correta do brinco.

Importante:

Após o prazo de 180 dias o brinco deverá ser retirado, cortando-se o pino fixador com tesoura ou alicate. A persistência do brinco no animal por mais tempo poderá favorecer o aparecimento de cepas resistentes, devido ao declínio da concentração do ingrediente ativo. Um novo brinco **Top Tag® 180** poderá ser colocado em seguida, aproveitando o mesmo orifício já perfurado na orelha, ou quando as condições climáticas favorecerem nova infestação pelas moscas.

Contraindicações:

Não tratar bovinos com menos de 3 meses de idade para evitar danos às orelhas.

Precauções:

- Evitar contato com a pele e os olhos. Utilizar luvas impermeáveis ao manusear o produto.
- Não comer, beber ou fumar durante o manuseio do produto.
- Lavar as mãos e o rosto com bastante água após o manuseio do produto.
- Após retirar brincos de um sachê, fechá-lo bem para proteger os que restarem.
- Retirar os brincos antes do abate dos animais.
- O brinco deve ser removido após um período de no máximo 180 dias e se o nível de infestação exigir deverá ser substituído, aproveitando a mesma perfuração na orelha.
- Não reutilizar as embalagens vazias. Inutilizá-las e descartá-las adequadamente, evitando a contaminação do meio ambiente. Não depositá-las em lagos ou cursos d'água.
- Não guardar o produto junto de alimentos, bebidas, rações animais, medicamentos, produtos domésticos e de higiene.
- Produto tóxico para abelhas.
- Intoxicação: Trata-se de um organofosforado. Em animais, usar sulfato de atropina associado a reativadores da colinesterase (Contrathion e PAM). Em humanos, recorrer imediatamente a socorro médico.

Efeitos colaterais:

Não foram registrados efeitos colaterais decorrentes do uso do produto quando seguidas as recomendações.

Interações medicamentosas:

Não aplicar outros tratamentos com organofosforados enquanto o produto permanecer no animal.

Venda sob prescrição e aplicação sob orientação do Médico Veterinário.

Deve ser mantido em sua embalagem original, em temperatura ambiente (15°C a 30°C) e protegido da luz solar. Manter fora do alcance de crianças e animais domésticos.

Telefone de Emergência Para Uso Médico: 0800 014 8110