

USO VETERINÁRIO

ATENÇÃO: OBEDECER AOS SEGUINTE PERÍODOS DE CARÊNCIA

BOVINOS: ABATE: O PRODUTO NÃO REQUER PERÍODO DE CARÊNCIA PARA BOVINOS TRATADOS. LEITE: O PRODUTO NÃO REQUER PERÍODO DE CARÊNCIA PARA CONSUMO DO LEITE DE ANIMAIS TRATADOS.

A UTILIZAÇÃO DO PRODUTO EM CONDIÇÕES DIFERENTES DAS INDICADAS NESTA BULA PODE CAUSAR A PRESENÇA DE RESÍDUOS ACIMA DOS LIMITES APROVADOS, TORNANDO O ALIMENTO DE ORIGEM ANIMAL IMPRÓPRIO PARA O CONSUMO.

Inseticida pronto para uso, destinado ao controle da mosca-dos-chifres.

Fórmula:

Cada brinco de 15 g contém:

Diazinon 3,0 g

Excipiente q.s.p. 15,0 g

Apresentação:

Sachê aluminizado contendo 20 brincos, acondicionados em caixa com 5 sachês.

Indicações:

O brinco TopTag® 20 é indicado no controle das infestações da mosca-dos-chifres (*Haematobia irritans*) em bovinos, incluindo aquelas cepas resistentes ao tratamento com inseticidas piretroides.

Aplicado conforme recomendação da bula, confere um período de proteção de 120 dias contra infestações da mosca-dos-chifres.

Modo de usar:

Aplicar um brinco em cada orelha, com o auxílio de um alicate aplicador apropriado, durante os meses mais favoráveis ao aparecimento das moscas.

A aplicação deve ser feita na porção mediana da orelha, na sua face externa, tomando cuidado especial para que o pino não atinja cartilagem ou vasos sanguíneos a fim de evitar danos à mesma.

O Diazinon transmigra paulatinamente da matriz de PVC e vai aos poucos se acumulando sobre o pelo do animal, onde forma uma camada fatal para as moscas que venham a pousar sobre o animal.

A aplicação deve ser feita conforme o esquema abaixo:




FIGURA 1

Desinfetar o alicate antes do uso. Com o dedo polegar, pressionar a alavanca de pressão do alicate e introduzir o brinco. O "colarinho" do brinco deve ser colocado voltado para baixo.



FIGURA 2

Introduzir o pino do brinco na ponteira do alicate até o ponto em que parte dela se projete para fora. Alinhar a ponta do macho com o furo da fêmea do brinco. O brinco e o contrapino estão prontos para aplicação.



FIGURA 3

Posicionar o brinco na superfície plana e no centro da face posterior da orelha. Evitar que o contrapino atinja cartilagem ou vasos sanguíneos para evitar danos à orelha.



FIGURA 4

Esta é a posição correta do brinco.

Importante:

Os brincos TopTag® 20 devem ser retirados 120 dias após a aplicação, cortando-se o pino fixador (macho) com uma tesoura ou alicate. Nesse momento, havendo ainda condições propícias a novas infestações, um novo brinco deve ser colocado, aproveitando-se a perfuração já existente na orelha.

Precauções gerais:

- Deve ser mantido em sua embalagem original, em temperatura ambiente (15°C a 30°C) e protegido da luz solar.
- Não usar o produto fora do prazo de validade.
- Não manusear o produto com as mãos desprotegidas (usar luvas).
- Não comer, beber ou fumar durante o manuseio do produto.
- Após o uso antes de beber, comer ou fumar, lavar as mãos e o rosto com água em abundância.
- De forma segura, descartar as embalagens vazias, evitando a contaminação do meio ambiente.
- Não contaminar lagos, fontes, rios e demais coleções de água, lavando as embalagens do produto ou lançando-lhes seus restos.
- Não fazer tratamentos simultâneos com outros organofosforados.

Advertências:

- Conservar a embalagem fora do alcance de crianças, de pessoas desprotegidas e de animais domésticos.
- Não guardar ou aplicar junto de alimentos, bebidas, ração animal, medicamentos, produtos domésticos e de higiene.
- Não utilizar a embalagem vazia.

Cuidados no manuseio do produto:

- Evitar contato com a pele e olhos.
- Usar luvas protetoras para aplicação dos brincos.
- Ao contato do produto com a pele, lave-a imediatamente.
- No caso de intoxicação humana, chamar imediatamente um médico.

Telefone de Emergência Para Uso Médico: 0800 014 8110

CUIDADO  **VENENO**

Antídoto:

Sulfato de Atropina, combinado com reativadores da colinesterase, como o Contrathion e PAM.

Venda sob prescrição e aplicação sob orientação do Médico Veterinário.