

# Torbugesic®

## USO VETERINÁRIO

Para o alívio da dor abdominal causada por cólica em equinos adultos e potros.

**VENDA SOB PRESCRIÇÃO DO MÉDICO VETERINÁRIO, COM RETENÇÃO OBRIGATORIA DA NOTIFICAÇÃO DE RECEITA.**

**ATENÇÃO: O USO PELO HOMEM PODE CAUSAR GRAVES RISCOS À SAÚDE.**

**Fórmula:** Cada mL contém:

Tartarato de butorfanol ..... 14,58 mg (\*)

(\*) equivalente a 10,0 mg Butorfanol base

**ATENÇÃO: OBEDECER AOS SEGUINTES PERÍODOS DE CARÊNCIA**

**EQUINOS:**

**ABATE: ESTE PRODUTO NÃO DEVE SER APLICADO EM EQUINOS DESTINADOS AO CONSUMO HUMANO.**

**A UTILIZAÇÃO DO PRODUTO EM CONDIÇÕES DIFERENTES DAS INDICADAS NESTA BULA PODE CAUSAR A PRESENÇA DE RESÍDUOS ACIMA DOS LIMITES APROVADOS, TORNANDO O ALIMENTO DE ORIGEM ANIMAL IMPRÓPRIO PARA O CONSUMO.**

**Generalidades:**

O Tartarato de butorfanol é uma droga totalmente sintética, um analgésico narcótico de ação central, com propriedades agonistas e antagonistas e com potente atividade antitussígena. É um membro do grupo fenantrênico, quimicamente um sal do Morfina-3, 14-diol, 17-(ciclobutilmetil)-, (-)-, (S-(R\*,R\*))-2,3-dihidroxiбутanodioato (1:1).

O local de ação dessa droga ainda não está completamente estabelecido. Supõe-se que atue no nível subcortical do sistema límbico, que possui receptores de opióides que provavelmente se ligam ao Butorfanol.

Sua ação em animais tem potência 4 vezes maior que a morfina e 30 vezes maior que a pentazocina. Em humanos a atividade analgésica é 5 a 7 vezes maior que a morfina e 20 vezes maior que a pentazocina. Além das propriedades analgésicas, o Butorfanol tem atividade antitussígena 15 a 20 vezes maior que a codeína via oral ou dextrometorfan em cães e cobaias.

Como antagonista, o Butorfanol é aproximadamente equivalente à nalorfina e 30 vezes mais potente que a pentazocina. Foi demonstrado ocorrer uma mínima depressão cardiopulmonar em cães, humanos e equinos.

Ao contrário do que acontece com os narcóticos clássicos analgésicos agonistas, que causam decréscimo na pressão sanguínea, redução do rendimento cardíaco e liberação concomitante de histamina, o Butorfanol não provoca liberação de histamina.

**Indicações:**

**Torbugesic®** é indicado para o alívio da dor abdominal causada por cólica em equinos adultos e potros. Diversos estudos clínicos têm demonstrado que **Torbugesic®** alivia a dor abdominal associada com a torção, parada do trânsito intestinal, intussuscepção, cólica espasmódica e timpânica e dor pós-parto.

**Posologia e Modo de Usar:**

**Torbugesic®** deve ser administrado na dose de 0,1 mg/kg, através de injeção intravenosa. Isso equivale a 3 mL de **Torbugesic®** para um equino de 300 kg. A dose pode ser repetida após 3 a 4 horas, porém a duração do tratamento não deve exceder 48 horas. Os efeitos do produto são observados dentro de 15 minutos após a administração.

**Contra-Indicações:**

Não aplicar **Torbugesic®** em equinos reprodutores, potros recém-nascidos e recém-desmamados.

**Interações medicamentosas:**

**Torbugesic®** é um potente analgésico: quando associado a outras drogas sedativas ou analgésicas, deverá ser administrado com cautela, pois pode provocar efeitos aditivos.

**Reações adversas:**

Em ensaios clínicos em equinos, o efeito colateral mais comumente observado foi uma leve ataxia que demorou 3 a 10 minutos. Uma ataxia mais pronunciada foi observada em 1,5% de 327 cavalos tratados e uma sedação moderada foi relatada em 9% dos equinos tratados.

Venda sob prescrição obrigatória e aplicação sob orientação do Médico Veterinário.

Conservar em local seco e fresco (15°C a 30°C), ao abrigo da luz solar direta, fora do alcance de crianças e animais domésticos.

**PRODUTO IMPORTADO**