

CÃO COM PRURIDO

ECTOPARASITAS
Pulgas, carrapatos,
Sarcoptes, Demodex,
Cheyletiella

INFECÇÃO
SECUNDÁRIA
Piodermite
Malassezia

TESTES

pente/
escova

algodão/papel
molhado



raspado
de pele

avulsão de pelos
tricograma

TESTES

fita

haste de algodão



"imprinting"
lesão



citológico



PRURIDO
PERSISTE

TRATE

ABORDAGEM DIAGNÓSTICA PARA CÃES COM PRURIDO

DERMATITE ALÉRGICA

ALÍVIO

REAVALIAÇÃO

MANUTENÇÃO

AVALIAÇÃO INICIAL
com suspeita de
dermatite alérgica



Prescreva Apoquel

Trate pulgas e carrapatos



NOVO EXAME CLÍNICO e
REAVALIAÇÃO

Interrompa o uso
de Apoquel

Determine a resposta

Novo exame e reavaliação

Ausência de
prurido
(diagnóstico de
dermatite alérgica
a picada de
ectoparasitas - DAPE)



Mantenha o
tratamento contra
ectoparasitas



Retorno
do prurido

INVESTIGAÇÕES
ADICIONAIS

Reintroduza Apoquel
por um período




Testes diagnósticos
adicionais



Alergia alimentar
(dieta de eliminação)

Ausência
de prurido
(diagnóstico de
alergia alimentar)



Retorno
do prurido

TRATAMENTO
EM LONGO
PRAZO



Reintroduza Apoquel ou
introduza Cytopoint

Diagnóstico de dermatite
atópica



Tratamento multimodal
de longo prazo para
controle (parasitas,
barreira cutânea,
dieta etc.)



Monitoramento
periódico (hemograma
e perfil bioquímico)

apoquel
oclacitinib

Apoquel é uma boa opção:

- ✦ Durante a triagem diagnóstica
- ✦ Quando os tutores preferem medicações por via oral
- ✦ Se os retornos mensais não são possíveis
- ✦ Nas crises de prurido

apoquel ou **CYTOPOINT**
oclacitinib lokivetmab

Apoquel ou Cytopoint podem ser considerados:

- ✦ Para evitar os efeitos adversos de outras terapias
- ✦ Na dermatite atópica crônica ou sazonal
- ✦ Diante de doenças concomitantes nas quais outros medicamentos estão sendo utilizados


CYTOPOINT
lokivetmab

Cytopoint é uma boa opção:

- ✦ Quando a conveniência de uma medicação a cada 4-8 semanas é valorizada
- ✦ Para os animais difíceis de medicar por via oral
- ✦ Em animais com menos de 1 ano de idade

COMO UTILIZAR APOQUEL E CYTOPOINT NAS DERMATITES ALÉRGICAS

SUSPEITA DE DERMATITE ALÉRGICA



1

apoquel
oclacitinib

Trate a **DAPE***

revolution® ou Simparic
sarolaner

MELHORA?

Sim: DAPE* confirmada
(manter controle contínuo de ectoparasitas)

Não: dieta de eliminação

Apoquel pode ser utilizado nas primeiras 3 semanas junto ao tratamento com antiparasitários para aliviar os sintomas de DAPE* até a eliminação completa dos ectoparasitas e dessensibilização do animal. É necessário interromper o tratamento para avaliar o prurido sem o efeito de Apoquel.

2

apoquel
oclacitinib

Dieta de **eliminação****

revolution® ou Simparic
sarolaner

MELHORA?

Sim: alergia alimentar confirmada
(manter dieta e controle de ectoparasitas)

Não: dermatite atópica confirmada

Apoquel pode ser utilizado durante as dietas de eliminação para aliviar o prurido e facilitar a adesão do tutor à mudança de alimentação. Após 3 semanas de dieta e tratamento com Apoquel, recomenda-se interromper o produto para avaliar o prurido. Se o cão não apresentar prurido, confirma-se o diagnóstico de alergia alimentar. Caso ele apresente, recomenda-se manter a dieta e voltar com Apoquel por mais 3 semanas, interrompendo-se a seguir para avaliar o prurido. Isto é necessário porque alguns animais podem precisar de até 8 semanas para exibir resposta à dieta.

3

apoquel
oclacitinib

ou CYTOPOINT
lokivetmab

Dermatite **atópica**

revolution® ou Simparic
sarolaner

- Controlar o prurido
- Evitar alterações de dieta
- Evitar exposição a alérgenos
- Manter controle contínuo de ectoparasitas
- Tratar infecções secundárias sempre que necessário (bactérias e *Malassezia*)
- Restabelecer a barreira cutânea

Caso não seja possível identificar e eliminar os alérgenos desencadeadores do prurido, o tratamento com Apoquel ou Cytopoint pode ser mantido a critério do médico veterinário, em conjunto com as demais medidas para controle da dermatite atópica.

*DAPE – dermatite alérgica a picada de ectoparasitas.

**Alguns animais podem apresentar melhora apenas parcial à dieta de eliminação. Esses animais podem ser considerados portadores de dermatite atópica responsiva a alimentos, e devem seguir o tratamento para dermatite atópica e controle de dieta.

SAC: 0800 011 19 19 | adm-sac@zoetis.com

www.zoetis.com.br | @zoetisbr /zoetisbrasil