

INFORMAÇÕES DE TRATAMENTO PARA VETERINÁRIOS

Palladia é o primeiro tratamento antiangiogênico e antiproliferativo para câncer aprovado especificamente para cães

- Palladia é indicado para o tratamento de mastocitomas (MCT) cutâneos recorrentes, de graus 2 ou 3 de Patnaik, com ou sem envolvimento de linfonodos regionais em cães
- Palladia faz parte de uma nova classe de agentes anticâncer denominada inibidores dos receptores de tirosina quinase, a qual se provou eficaz no tratamento de alguns cânceres humanos
- Palladia é um comprimido oral que pode ser administrado em domicílio pelo tutor do cão

A maioria dos eventos adversos (EA) associados a Palladia são controláveis se reconhecidos precocemente.

- Os efeitos colaterais mais comumente relatados incluem diarreia, anorexia, letargia, vômito, claudicação e perda de peso
- Os EA com Palladia podem ser graves, porém, a maioria tem intensidade leve a moderada e é geralmente controlável, principalmente se reconhecidos precocemente
- Os EA mais frequentemente associados a Palladia são efeitos colaterais gastrintestinais (GI)
- Recomenda-se monitoramento dos EA gastrintestinais. Complicações GI graves e ocasionalmente fatais, incluindo perfuração GI, ocorreram raramente em cães tratados com Palladia

Recomenda-se prevenção ativa de EA GI em cães tratados com Palladia

- Bloqueadores de H1
- Bloqueadores de H2
- Inibidores da bomba de prótons
- Antieméticos

Toxicidades GI são geralmente controláveis, principalmente quando há intervenção rápida

- O tratamento deve ser iniciado ao primeiro sinal de toxicidade GI (vômito, diarreia, perda de apetite, perda de peso, letargia)
- Terapias a considerar além de medicamentos preventivos:**
 - Antimicrobianos
 - Protetores gastrintestinais locais
 - Medidas de suporte conforme necessário
- Se os EA gastrintestinais não cederem com a terapia, ou se forem intensos, o tratamento deve ser suspenso e a posologia e/ou dose do medicamento devem ser alteradas
- Se forem observados melena ou hematoquesia, interrompa o tratamento com Palladia imediatamente e inicie medidas de suporte (utilizando os medicamentos relacionados acima)

Cãibras e/ou claudicação normalmente não são intensos, podendo ser controlados através de terapia

- Se a claudicação for leve, considere medicamentos analgésicos
- Se a claudicação for significativa, suspenda o tratamento
- Claudicação normalmente não é intensa, e não parece ser um problema recorrente quando a terapia é reiniciada após um período de suspensão

Diversos fatores influenciam o espectro e a intensidade dos EA

- Estágio do câncer
 - Cães com a doença em estágios mais avançados geralmente apresentam uma pontuação de desempenho menor, o que possivelmente poderia influenciar a magnitude dos EA
- Tipo de Câncer
 - Sabe-se que cães com MTC macroscópicos possuem altos níveis de histamina na circulação, o que os torna predispostos a ulceração gastrintestinal e outros EA gastrintestinais; estes podem ser agravados pela terapia com Palladia
- Condições pré-existentes
 - Doença hepática, doença renal e doença cardíaca podem influenciar as pontuações de desempenho, e também podem impactar o metabolismo/eliminação de medicamentos, desta forma agravando os EA associados a Palladia
 - O monitoramento específico deve variar com base nas necessidades individuais dos pacientes. Por favor, adapte o cronograma abaixo com base em seu critério clínico:

Consulta	Hemograma completo	Bioquímica sérica	Sangue oculto nas fezes [†]	Urina tipo 1	Peso
Inicial	✓	✓	✓	✓	✓
Semana 1	✓				✓
Semana 2	✓		✓		✓
Semana 3	opcional				opcional
Semana 4	✓	✓	✓	✓	✓
A cada 4 semanas	✓	✓	✓	✓	✓

*Trata-se apenas de sugestões, ficando a critério do médico veterinário a realização de outros exames ou alterar a frequência de execução.

[†]Verifique sangue nas fezes somente se houver alguma preocupação de saúde.